

商品名 メダゼパム錠2（ツルハラ） 医薬品基本情報

薬効	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	一般名	メダゼパム錠
英名	Medazepam TSURUHARA	剤型	錠
薬価	8.30	規格	2mg 1錠
メーカー	鶴原製薬	毒劇区分	(向)

メダゼパム錠2（ツルハラ）の効能・効果

神経症における緊張、神経症における不安、神経症における抑うつ、(循環器疾患、消化器疾患、自律神経失調症、内分泌系疾患、心身症)の(身体症候、緊張、不安、抑うつ)

メダゼパム錠2（ツルハラ）の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 心障害、脳器質的障害、重篤な呼吸不全、中等度呼吸不全、腎機能障害、肝機能障害、投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニルを投与された	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

メダゼパム錠2（ツルハラ）の副作用等

1. 刺激興奮、錯乱	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 譫妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想、離脱症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 薬物依存、痙攣発作	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
4. 眠気	記載場所	その他の副作用

5. 過敏症、発疹、ふらつき、眩暈、歩行失調、頭重、食欲不振、便秘、下痢、悪心、嘔吐、胸やけ、胃腸障害、口渇、筋弛緩、易疲労感、筋緊張低下症状、尿蛋白	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 気分昂揚感、調節障害、振戦、しびれ、浅眠多夢、言語障害、黄疸、Al-P上昇、貧血、白血球減少、発汗、熱感、のぼせ、浮腫、性欲への影響、生理異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
7. 奇形を有する児、障害児、哺乳困難、嘔吐、活動低下、筋緊張低下、過緊張、嗜眠、傾眠、呼吸抑制、無呼吸、チアノーゼ、易刺激性、神経過敏、振戦、低体温、頻脈、離脱症状、新生児仮死、黄疸増強、体重減少、運動失調、作用が変化、作用が遅延	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

メダゼパム錠2（ツルハラ）の相互作用

1. 薬剤名等：アルコール			
発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	共に中枢神経抑制作用を有する	指示	希望禁止
2. 薬剤名等：中枢神経抑制剤			
発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	共に中枢神経抑制作用を有する	指示	希望禁止
3. 薬剤名等：MAO阻害剤			
発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤の代謝が抑制	指示	希望禁止
4. 薬剤名等：シメチジン			
発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤の代謝が抑制	指示	注意

