

商品名 トフィソパム錠50mg「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	一般名	トフィソパム50mg錠
英名	Tofisopam	剤型	錠
薬価	6.10	規格	50mg 1錠
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

トフィソパム錠50mg「サワイ」の効能・効果

(更年期障害、自律神経失調症、頭部損傷、頸部損傷、卵巣欠落症状)の(倦怠感、心悸亢進、頭重、頭痛、発汗、自律神経症状)

トフィソパム錠50mg「サワイ」の使用制限等

1. ロミタピドメシル酸塩投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症、脳器質的障害、重篤な呼吸不全、中等度呼吸不全、投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニルを投与された	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

トフィソパム錠50mg「サワイ」の副作用等

1. 薬物依存、不安、焦躁、抑うつ症状、手足のふるえ、しびれ、食欲不振、下痢、過敏症、そう痒感、発熱、顔面浮腫、AST上昇、ALT上昇、倦怠感、血圧上昇、ほてり、乳房痛、乳汁分泌、月経異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 眠気、めまい、ふらつき、不眠、頭痛、口渇、腹痛、悪心、嘔吐、便秘、発疹、脱力感、動悸	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 奇形を有する児、障害児、哺乳困難、嘔吐、活動低下、筋緊張低下、過緊張、嗜眠、傾眠、呼吸抑制、無呼吸、チアノーゼ、易刺激性、神経過敏、振戦、低体温、頻脈、離脱症状、新生児仮死、黄疸増強、作用が変化、作用が遅延	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

トフィソパム錠50mg「サワイ」の相互作用

- 薬剤名等：ロミタピドメシル酸塩

発現事象	血中濃度が著しく上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤がCYP3Aを阻害することにより、ロミタピドメシル酸塩の代謝が阻害	指示	禁止

2. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	両薬剤の中枢神経抑制作用が相加的に増強	指示	注意

3. 薬剤名等：アルコール

発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	両者の中枢神経抑制作用が相加的に増強	指示	注意

4. 薬剤名等：タクロリムス水和物

発現事象	血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤がCYP3A4によるタクロリムスの代謝を抑制	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』