

商品名 サイレース静注2mg 医薬品基本情報

薬効	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	一般名	フルニトラゼパム注射液
英名	Silece	剤型	注射液
薬価	125.00	規格	2mg 1管
メーカー	エーザイ	毒劇区分	(向)

サイレース静注2mgの効能・効果

全身麻酔の導入、局所麻酔時の鎮静

サイレース静注2mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 心障害、脳器質的障害、高度重症、呼吸予備力の制限、腎機能障害、肝機能障害、投与した薬剤が特定されないままにフルマゼニルを投与された	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サイレース静注2mgの副作用等

1. 無呼吸、呼吸抑制、舌根沈下、重篤な転帰	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
2. 錯乱	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 覚醒困難、興奮、多弁、AST上昇、しゃっくり、血圧低下、徐脈、嘔吐、体動	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 麻酔後睡眠、ALT上昇、咳、頻脈、過敏症、発疹、尿閉、乏尿	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. 呼吸抑制、無呼吸、心停止、催奇形作用、口唇裂、口蓋裂、哺乳困難、嘔吐、活動低下、筋緊張低下、過緊張、嗜眠、傾眠、チアノーゼ、易刺激性、神経過敏、振戦、低体温、頻脈、離脱症状、新生児仮死、黄疸増強、体重減少、中毒症状、あえぎ呼吸、アシドーシス、痙攣、運動失調、昏睡、中枢神経抑制、血栓性静脈炎、末梢壊死、局所障害、血管痛、作用が変化、作用が遅延

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

サイレース静注2mgの相互作用

1. 薬剤名等：アルコール

発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	ともに中枢神経抑制作用を有するため、相互に作用を増強	指示	希望禁止

2. 薬剤名等：飲酒

発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	ともに中枢神経抑制作用を有するため、相互に作用を増強	指示	希望禁止

3. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	ともに中枢神経抑制作用を有するため、相互に作用を増強	指示	注意

4. 薬剤名等：モノアミン酸化酵素阻害剤

発現事象	クロルジアゼポキシドで舞踏病	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

5. 薬剤名等：シメチジン

発現事象	本剤の中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
理由・原因	シメチジンが肝薬物代謝酵素（CYP3A4）を阻害するため本剤の血中濃度が上昇	指示	注意

サイレース静注2mgの配合変化

1. 薬剤名等：他の注射剤

発現事象	経時的に変化	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

2. 薬剤名等：アルカリ性薬剤

発現事象	黄変化	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.