

商品名 レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 医薬品基本情報

薬効	1139 その他の抗てんかん剤	一般名	レベチラセタムシロップ用
英名	Levetiracetam	剤型	シロップ用
薬価	63.70	規格	50% 1g
メーカー	陽進堂	毒劇区分	

レベチラセタムドライシロップ50%「YD」の効能・効果

てんかんの(二次性全般化発作、部分発作)、強直間代発作

レベチラセタムドライシロップ50%「YD」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害を有する小児	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
3. 腎機能障害、重度肝機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
4. 腎機能障害、血液透析を受けている末期腎機能障害、重度肝機能障害、Child－Pugh分類C	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

レベチラセタムドライシロップ50%「YD」の副作用等

1. 中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis 、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens－Johnson症候群、発熱、紅 斑、水疱、びらん、そう痒、咽頭痛、眼充血、口内炎、薬剤性過敏症症候群、発疹 、肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現、遅発 性の重篤な過敏症状、ヒトヘルペスウイルス6再活性化、HHV－6再活性化、ウ イルス再活性化、重篤な血液障害、汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、好中球 減少、血小板減少、肝不全、肝炎、重篤な肝障害、膵炎、激しい腹痛、嘔気、嘔吐 、腓醇素値上昇、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上 昇、尿中ミオグロビン上昇、急性腎障害、悪性症候群、筋強剛、血清CK上昇、頻 脈、血圧変動、意識障害、発汗過多、ミオグロビン尿、腎機能低下	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2. 易刺激性、錯乱、焦燥、興奮、攻撃性、精神症状、自殺企図	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 浮動性めまい、頭痛、傾眠、鼻咽頭炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 錯乱状態、敵意、気分動揺、神経過敏、人格障害、精神運動亢進、舞踏アテトーゼ運動、嗜眠、強迫性障害、多形紅斑、血管性浮腫、事故による外傷、事故による皮膚裂傷	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 不眠症、感覚鈍麻、気分変動、振戦、易刺激性、痙攣、抑うつ、激越、健忘、注意力障害、幻覚、運動過多、記憶障害、錯感覚、思考異常、平衡障害、感情不安定、異常行動、協調運動異常、怒り、ジスキネジー、不安、体位性めまい、睡眠障害、緊張性頭痛、精神病的障害、パニック発作、譫妄、複視、結膜炎、霧視、眼精疲労、眼そう痒症、麦粒腫、好中球数減少、貧血、血中鉄減少、鉄欠乏性貧血、血小板数減少、白血球数増加、白血球数減少、心電図QT延長、高血圧、腹痛、便秘、下痢、胃腸炎、悪心、口内炎、嘔吐、齲歯、歯肉炎、痔核、胃不快感、歯痛、消化不良、口唇炎、歯肉腫脹、歯周炎、ALP増加、肝機能異常、膀胱炎、尿中ブドウ糖陽性、尿中血陽性、尿中蛋白陽性、月経困難症、頻尿、咽喉頭疼痛、上気道炎症、気管支炎、咳嗽、鼻漏、咽頭炎、インフルエンザ、鼻炎、鼻出血、肺炎、食欲不振、湿疹、皮膚炎、皮膚そう痒症、発疹、ざ瘡、脱毛症、単純ヘルペス、带状疱疹、皮膚白癬感染、背部痛、肩痛、筋肉痛、筋骨格硬直、関節痛、頸部痛、四肢痛、筋力低下、耳鳴、回転性めまい、倦怠感、発熱、体重減少、血中トリグリセリド増加、胸痛、体重増加、無力症、疲労、末梢性浮腫、抗痙攣剤濃度増加	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 攻撃性、激越、怒り、不安、無力感、離人症、抑うつ、情動不安定、敵意、運動過多、易刺激性、神経過敏、神経症、人格障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 血中濃度低下、骨格変異、骨格異常増加、成長遅延、仔死亡率増加、胚致死、奇形増加、新生児薬物離脱症候群、傾眠、激越、攻撃性、意識レベル低下、呼吸抑制、昏睡、攻撃の行動悪化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 自殺念慮、自殺企図	記載場所	使用上の注意
	頻度	5%未満



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』