

商品名 タイオゼット注5mL 医薬品基本情報

薬効	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	一般名	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合5mL注射液
英名	Taiozet	剤型	注射液
薬価	61.00	規格	5mL 1管
メーカー	日医工岐阜工場	毒劇区分	(劇)

タイオゼット注5mLの効能・効果

症候性神経痛、筋肉痛、肩関節周囲炎、腰痛症

タイオゼット注5mLの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ショック状態、大量出血、注射部位又はその周辺に炎症、敗血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 15歳未満の水痘、15歳未満のインフルエンザ	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、潰瘍性大腸炎、クローン病、髄膜炎、中枢神経系疾患、灰白脊髄炎、血液疾患、抗凝血剤治療中、重篤な高血圧症、脊柱の著明な変形	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

タイオゼット注5mLの副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、心停止、脈拍異常、血圧低下、呼吸抑制、チアノーゼ、意識障害、喘鳴、眼瞼浮腫、発赤、蕁麻疹、頻脈、不整脈、血圧変動、急激な体温上昇、筋強直、血液暗赤色化、過呼吸、発汗、アシドーシス、高カリウム血症、ミオグロビン尿、ポートワイン色尿、重篤な悪性高熱	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 振戦、痙攣、中毒症状、眠気、不安、興奮、霧視、めまい、悪心、嘔吐、頭痛、気分不良、ショック、中毒、過敏症、蕁麻疹、湿疹、全身のかゆみ、全身発赤、皮膚症状、全身性発熱、浮腫、一過性麻痺、疼痛、腫脹、発赤、熱感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

3. 過度の血圧低下、化膿性髄膜炎症状、敗血症性髄膜炎、ショック、中毒症状、血腫、脊髄障害、低血圧、脊髄損傷、神経根損傷、腎機能障害、尿量減少、羊水過少症、胎児動脈管収縮、催奇形作用、胎仔動脈管収縮、ライ症候群、中枢神経系症状、不安、興奮、多弁、口周囲知覚麻痺、舌のしびれ、ふらつき、聴覚過敏、耳鳴、視覚障害、振戦、意識消失、全身痙攣、低酸素血症、高炭酸ガス血症、呼吸停止、心血管系症状、血圧低下、徐脈、心筋収縮力低下、心拍出量低下、刺激伝導系抑制、心室性頻脈、心室細動、心室性不整脈、循環虚脱、心停止、痙攣、心機能抑制、硬結、発赤、腫脹、熱感、一時的不妊

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

タイオゼット注5mLの相互作用

1. 薬剤名等：抗凝血剤治療中

発現事象	血腫、脊髄障害
------	---------

理由・原因	出血しやすい
-------	--------

投与条件	硬膜外ブロック
------	---------

指示	注意
----	----

