

## 商品名 ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	1162 ビペリデン製剤	一般名	ビペリデン塩酸塩錠
英名	Biperiden hydrochloride	剤型	錠
薬価	5.90	規格	2mg 1錠
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

### ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」の効能・効果

特発性パーキンソニズム、脳炎後パーキンソニズム、中毒性パーキンソニズム、動脈硬化性パーキンソニズム、パーキンソニズム、向精神薬投与によるアカシジア、向精神薬投与によるパーキンソニズム、向精神薬投与によるジスキネジア<遅発性を除く>

### ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」の使用制限等

1. 閉塞隅角緑内障、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重症筋無力症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 開放隅角緑内障、前立腺肥大、尿路に閉塞性疾患、胃腸管に閉塞性疾患、頻拍傾向、不整脈、てんかん、栄養不良状態を伴う身体的疲弊、脱水を伴う身体的疲弊、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」の副作用等

1. 悪性症候群、発熱、無動緘黙、意識障害、強度筋強剛、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧変動、発汗、白血球増加、血清CK上昇、ミオグロビン尿、腎機能低下、依存性	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 幻覚、せん妄、精神錯乱、不安、嗜眠、記憶障害、口渇、悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、便秘、口内炎、排尿困難、尿閉、過敏症、発疹、血圧低下、血圧上昇、眼調節障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 肝障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 気分高揚、発汗抑制、悪性症候群、せん妄、不安、精神症状、口渇、排尿困難、便秘、体温上昇、頻脈、不整脈、尿閉、興奮、幻覚、妄想、錯乱、痙れん、呼吸抑制、中枢神経興奮症状	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」の相互作用

### 1. 薬剤名等：抗精神病薬との併用

発現事象	発汗、頻脈、意識障害、ミオグロビン尿、血圧変動、腎機能低下、白血球増加、発熱、無動緘黙、嚥下困難、悪性症候群、強度筋強剛、不随意運動、血清CK上昇	投与条件	本剤及び併用薬の減量又は中止
理由・原因	-	指示	注意

### 2. 薬剤名等：抗うつ剤との併用

発現事象	発汗、頻脈、意識障害、ミオグロビン尿、血圧変動、腎機能低下、白血球増加、発熱、無動緘黙、嚥下困難、悪性症候群、強度筋強剛、不随意運動、血清CK上昇	投与条件	本剤及び併用薬の減量又は中止
理由・原因	-	指示	注意

### 3. 薬剤名等：ドパミン作動系抗パーキンソン剤との併用

発現事象	発汗、頻脈、意識障害、ミオグロビン尿、血圧変動、腎機能低下、白血球増加、発熱、無動緘黙、嚥下困難、悪性症候群、強度筋強剛、不随意運動、血清CK上昇	投与条件	本剤及び併用薬の減量又は中止
理由・原因	-	指示	注意

### 4. 薬剤名等：抗コリン作用を有する薬剤

発現事象	悪心、食欲不振、腸管麻痺、麻痺性イレウス、嘔吐、著しい便秘、腹部の弛緩、腹部の膨満、腸内容物のうっ滞	投与条件	-
理由・原因	抗コリン作用が強くあらわれる	指示	注意

### 5. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象	幻覚、眠気、妄想、精神運動機能低下	投与条件	-
理由・原因	中枢神経抑制作用又は抗コリン作用が強くあらわれる	指示	注意

### 6. 薬剤名等：抗パーキンソン剤

発現事象	幻覚・妄想等の精神神経系の副作用が増強	投与条件	-
理由・原因	ドパミン過剰及びアセチルコリン系神経機能低下	指示	注意

