

商品名 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」 医薬品基本情報

薬効	1169 その他の抗パーキンソン剤	一般名	プラミペキソール塩酸塩水和物錠
英名	Pramipexole hydrochloride JG	剤型	錠
薬価	9.40	規格	0.125mg 1錠
メーカー	日本ジェネリック	毒劇区分	(劇)

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」の効能・効果

パーキンソン病、中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群、中等度から高度の特発性下肢静止不能症候群

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 透析中、クレアチニンクリアランスが $\geq 20\text{mL}/\text{min}$ 未満の高度腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	相対禁止
3. 透析、非常に高度腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
5. 幻覚又はその既往、精神症状又はその既往、妄想又はその既往、重篤な心疾患又はその既往、低血圧症、腎機能障害、クレアチニンクリアランスが $\geq 50\text{mL}/\text{min}$ 未満	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」の副作用等

1. 幻覚、幻視	記載場所	重大な副作用
----------	------	--------

2. 錯乱、低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量増加、高張尿、痙攣、意識障害、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、SIADH、悪性症候群、発熱、無動無言、高度筋硬直、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧変動、発汗、血清CK上昇、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症、急性腎障害、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、総ビリルビン上昇、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 突発的睡眠、妄想、せん妄、激越	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. CK上昇、ジスキネジア、傾眠、めまい、頭痛、口内乾燥、食欲不振、不眠、悪心、消化不良、便秘、胃不快感、嘔吐	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 過敏症状、発疹、皮膚そう痒症、霧視、視力低下、薬剤離脱症候群、無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛、病的性欲亢進、性欲減退、暴食、病的賭博、不穏、過食、体重増加、健忘、強迫性購買、体重減少、 γ -GTP上昇、尿閉、自発陰茎勃起	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 多汗、蕁麻疹、網状皮斑、背部痛、腰痛、ジストニア、緊張亢進、舌麻痺、運動過多、ミオクローヌス、声が出にくい、異常感覚、知覚減退、パーキンソニズム増悪、起立性低血圧、高血圧、唾液増加、苦味、眼のちらつき、複視、羞明、不安、神経過敏、気分高揚感、悪夢、早朝覚醒、ねぼけ様症状、異夢、徘徊、腹痛、胃潰瘍、胃炎、上腹部痛、口内炎、鼓腸放屁、イレウス、肝機能異常、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、プロラクチン低下、成長ホルモン上昇、血糖値上昇、低血圧、動悸、排尿頻回、尿蛋白陽性、末梢性浮腫、胸痛、倦怠感、疲労感、脱力感、手がピリピリする、転倒、口渇、呼吸困難	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 失神、肺炎、しゃっくり	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
8. めまい、立ちくらみ、ふらつき、起立性低血圧、病的賭博、持続的にギャンブルを繰り返す状態、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食、衝動制御障害、悪性症候群、薬剤離脱症候群、無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛、妊娠率低下、生存胎仔数減少、出生仔体重低下、プロラクチン分泌抑制、乳汁分泌抑制、幻覚、精神症状、悪心、嘔吐、過度の鎮静、運動過多、激越、低血圧、網膜変性増加	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「JG」の相互作用

1. 薬剤名等：カチオン輸送系を介して腎排泄される薬剤		投与条件	-
発現事象	ジスキネジア・幻覚等の副作用が増強		
理由・原因	双方あるいはいずれかの薬剤の腎尿細管分泌が減少し、腎クリアランスが低下	指示	注意
2. 薬剤名等：鎮静剤		投与条件	-
発現事象	作用が増強		
理由・原因	-	指示	注意
3. 薬剤名等：アルコール			

発現事象	作用が増強	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

4. 薬剤名等：ドパミン拮抗剤

発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	本剤はドパミン作動薬であり、併用により両薬剤の作用が拮抗	指示	注意

5. 薬剤名等：抗パーキンソン剤

発現事象	ジスキネジア・幻覚・錯乱等の副作用が増強	投与条件	-
理由・原因	相互に作用が増強	指示	注意

