

商品名 コムタン錠100mg 医薬品基本情報

薬効	1169 その他の抗パーキンソン剤	一般名	エンタカポン錠
英名	Comtan	剤型	錠
薬価	74.50	規格	100mg 1錠
メーカー	オリオンファーマ・ジャパン	毒劇区分	

コムタン錠100mgの効能・効果

パーキンソン病の(wearing-off現象、症状の日内変動)の改善

コムタン錠100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、横紋筋融解症又はその既往、悪性症候群又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
3. 褐色細胞腫、パラガングリオーマ、肝障害又はその既往、麦角系ドパミン作動薬を併用、起立性低血圧を引き起こすおそれのある薬剤服用中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

コムタン錠100mgの副作用等

1. ドパミン作動性副作用、ジスキネジー	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 傾眠、幻覚	記載場所	重大な副作用
3. 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症、急性腎障害、錯乱、胆汁うっ滞性肝炎、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 悪性症候群、高熱、意識障害、昏睡、高度筋硬直、不随意運動、ショック状態、激越、頻脈、不安定血圧、CK上昇、横紋筋融解症、急性腎障害、突発的睡眠、幻視、幻聴	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満

5. 不眠症、ジスキネジー、ジストニー、便秘、悪心、着色尿、貧血

記載場所	その他の副作用
------	---------

6. 紅斑性皮疹、斑状丘疹状皮疹、蕁麻疹、紫斑、皮膚変色、毛髪変色、髭変色、爪変色、激越、失神、回転性めまい、運動低下、鼓腸、大腸炎、疲労、無力症、細菌感染、血清鉄減少

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

7. 多汗症、悪夢、妄想、不安、病的性欲亢進、頭痛、浮動性めまい、体位性めまい、味覚異常、運動過多、振戦、上腹部痛、下痢、体重減少、胃不快感、食欲不振、嘔吐、レッチング、消化不良、胃炎、腹痛、AST増加、ALT増加、 γ -GTP増加、尿潜血陽性、頻尿、BUN上昇、ヘモグロビン減少、白血球数減少、赤血球数減少、白血球数増加、ヘマトクリット減少、鉄欠乏性貧血、けん怠感、末梢性浮腫、口渇、関節痛、筋痛、背部痛、筋痙攣、CK増加、LDH増加、ALP増加、血圧低下、起立性低血圧、高血圧、転倒、呼吸困難

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

8. 悪性症候群、横紋筋融解症、病的賭博、持続的にギャンブルを繰り返す状態、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食、衝動制御障害、高血圧クリーゼ、ジスキネジー、胎仔骨化遅延、錯乱、活動性低下、傾眠、皮膚変色、蕁麻疹、線維性合併症

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

コムタン錠100mgの相互作用

1. 薬剤名等：抗パーキンソン剤

発現事象	ジスキネジー、ドパミン作動性副作用
------	-------------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	本剤はレボドパの生物学的利用率を高める
-------	---------------------

指示	注意
----	----

2. 薬剤名等：薬物代謝酵素CYP2C9により代謝される薬剤

発現事象	-
------	---

投与条件	-
------	---

理由・原因	本剤は薬物代謝酵素CYP2C9を阻害
-------	--------------------

指示	注意
----	----

3. 薬剤名等：COMTにより代謝される薬剤

発現事象	不整脈、血圧変動、心拍数増加
------	----------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	カテコール基を有するこれらの薬剤はCOMTにより代謝されるが、本剤はこれらの薬剤の代謝を阻害し、作用を増強
-------	---

指示	注意
----	----

4. 薬剤名等：選択的MAO-B阻害剤

発現事象	血圧上昇
------	------

投与条件	-
------	---

理由・原因	選択的MAO-B阻害剤は用量の増加とともにMAO-Bの選択的阻害効果が低下し、非選択的MAO阻害による危険性があるため、本剤との併用により、生理的なカテコールアミンの代謝が阻害
-------	--

指示	注意
----	----

5. 薬剤名等：ワルファリン

発現事象	AUCを18%増加、プロトロンビン比<INR値>を13%増加
------	--------------------------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----

6. 薬剤名等：鉄剤

発現事象 効果が減弱

投与条件 -

理由・原因 本剤は消化管内で鉄とキレートを形成

指示 注意

7. 薬剤名等：イストラデフィリン

発現事象 ジスキネジーの発現頻度の上昇

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

8. 薬剤名等：麦角系ドパミン作動薬を併用

発現事象 線維性合併症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

9. 薬剤名等：起立性低血圧を引き起こすおそれのある薬剤服用中

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 本剤はレボドパ誘発性の起立性低血圧を増悪

指示 注意

