

商品名 クエチアピン錠200mg「日新」 医薬品基本情報

薬効	1179 その他の精神神経用剤	一般名	クエチアピンフマル酸塩錠
英名	Quetiapine NISSIN	剤型	錠
薬価	45.50	規格	200mg 1錠
メーカー	日新製薬	毒劇区分	(劇)

クエチアピン錠200mg「日新」の効能・効果

統合失調症

クエチアピン錠200mg「日新」の使用制限等

1. 昏睡状態、中枢神経抑制剤の強い影響下、アドレナリン投与中＜アナフィラキシー救急治療・歯科浸潤又は伝達麻酔除く＞、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、糖尿病又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
3. 高血糖、肥満、糖尿病の危険因子を有する、低血圧又はその恐れ・疑い、脳血管障害又はその恐れ・疑い、心・血管疾患又はその恐れ・疑い、痙攣性疾患又はその既往、てんかん又はその既往、不整脈又はその既往、先天性QT延長症候群、自殺企図の既往、自殺念慮、糖尿病の家族歴、脱水状態、長期臥床、不動状態、肝機能障害、高齢認知症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

クエチアピン錠200mg「日新」の副作用等

1. 高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、死亡、致命的経過	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 低血糖、脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害、低血糖症状、高熱が持続、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害、死亡、横紋筋融解症、筋肉痛、C K上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、痙攣、無顆粒球症、白血球減少、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸、腸管麻痺、食欲不振、悪心、嘔吐、著しい便秘、腹部膨満、腹部弛緩、腸内容物うっ滞、麻痺性イレウス、深部静脈血栓症、肺塞栓症、静脈血栓症、血栓塞栓症、息切れ、胸痛、四肢疼痛、浮腫、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Steven Johnson症候群、多形紅斑	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 悪性症候群、Syndrome malin、無動緘黙、強度筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧変動、発汗、発熱、白血球増加、CK上昇、ミオグロビン尿、腎機能低下、遅発性ジスキネジア、口周部不随意運動、不随意運動	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. 不眠、易刺激性、傾眠、不安、頭痛、めまい、アカシジア、振戦、構音障害、頻脈、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、便秘、食欲減退、高プロラクチン血症、T4減少、倦怠感、無力症、CK上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 統合失調性反応、協調不能、レストレスレッグス症候群、軽躁、注意力障害、過眠症、自殺念慮、自傷行動、焦躁感、鎮静、意識レベル低下、せん妄、敵意、錐体外路症状、構語障害、錐体外路障害、パーキンソン症候群、白血球数増加、好酸球増加症、貧血、血小板減少、血管拡張、動悸、心電図QT延長、肝機能検査異常、咳増加、鼻閉、鼓腸放屁、消化管障害、吐血、直腸障害、過食、腹部膨満、胃食道逆流性疾患、肺炎、胃炎、胃不快感、弱視、結膜炎、T3減少、痛風、低ナトリウム血症、水中毒、多飲症、TSH減少、TSH上昇、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、尿糖陽性、FT4減少、乳汁漏出症、過敏症、血管浮腫、そう痒、湿疹、持続勃起、射精異常、インポテンス、頻尿、膀胱炎、尿蛋白陽性、顔面浮腫、頸部硬直、腫瘍、過量投与、骨盤痛、歯牙障害、関節症、滑液包炎、筋無力症、痙攣、悪化反応、偶発外傷、耳障害、味覚倒錯、ざ瘡、脱毛症、薬剤離脱症候群、不眠、悪心、頭痛、下痢、嘔吐、口渇、回転性めまい、悪寒、靱帯捻挫、意欲低下、末梢性浮腫、関節痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 幻覚の顕在化、健忘、攻撃的反応、昏迷、神経症、妄想の顕在化、リビドー亢進、感情不安定、激越、錯乱、思考異常、自殺企図、人格障害、躁病反応、多幸症、舞踏病様アテトシス、片頭痛、悪夢、うつ病、独語、衝動行為、自動症、筋強剛、流涎過多、運動緩慢、歩行障害、ジスキネジア、嚥下障害、ジストニア、眼球回転発作、顆粒球減少、起立性低血圧、心悸亢進、心電図異常、低血圧、高血圧、徐脈、不整脈、失神、Al-P上昇、γ-GTP上昇、ビリルビン血症、去痰困難、鼻炎、悪心、食欲亢進、嘔吐、腹痛、下痢、消化不良、瞳孔反射障害、高コレステロール血症、月経異常、甲状腺疾患、高脂血症、高カリウム血症、肥満症、発疹、排尿障害、排尿困難、尿失禁、尿閉、BUN上昇、口内乾燥、体重増加、多汗、発熱、体重減少、胸痛、筋肉痛、舌麻痺、しびれ感、背部痛、浮腫、ほてり、歯痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 著しい血糖値上昇、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、死亡	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 著しい血糖値上昇、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、致命的経過	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 低血糖、脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害、低血糖症状	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 無顆粒球症、白血球減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

11.	口渇、多飲、多尿、頻尿、血糖値上昇、体重増加、肥満、起立性低血圧、立ちくらみ、めまい、低血圧症状、不眠、悪心、頭痛、下痢、嘔吐、離脱症状、一過性血圧降下、QT間隔延長、肺塞栓症、静脈血栓症、血栓塞栓症、哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張低下、易刺激性、錐体外路症状、鎮静、頻脈、低血圧、昏睡、死亡、突然死、心筋梗塞、出血性胃潰瘍、急性腎障害、死亡率上昇、三角状後白内障、乳腺腫瘍	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明

クエチアピン錠200mg「日新」の相互作用

1.	薬剤名等	アドレナリン		
	発現事象	作用を逆転させ重篤な血圧降下	投与条件	-
	理由・原因	アドレナリンはアドレナリン作動性 α 、 β －受容体の刺激剤であり、本剤の α －受容体遮断作用により、 β －受容体の刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強	指示	禁止
2.	薬剤名等	中枢神経抑制剤		
	発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
	理由・原因	薬力学的相互作用を起こす	指示	慎重投与
3.	薬剤名等	アルコール		
	発現事象	中枢神経抑制作用が増強	投与条件	-
	理由・原因	薬力学的相互作用を起こす	指示	慎重投与
4.	薬剤名等	強いCYP3A4阻害作用を有する薬剤		
	発現事象	本剤の作用を増強、本剤の血漿中濃度が高値となりQT間隔が延長	投与条件	-
	理由・原因	本剤の主要代謝酵素であるCYP3A4を強く阻害するため、血漿中濃度が上昇	指示	慎重投与
5.	薬剤名等	CYP3A4阻害作用を有する薬剤		
	発現事象	本剤の作用を増強	投与条件	-
	理由・原因	本剤の主要代謝酵素であるCYP3A4を阻害するため、血漿中濃度が上昇	指示	慎重投与
6.	薬剤名等	CYP3A4誘導作用を有する薬剤		
	発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
	理由・原因	本剤の主要代謝酵素であるCYP3A4の誘導により、本剤のクリアランスが増加	指示	注意
7.	薬剤名等	QT延長を起こすことが知られている薬剤		
	発現事象	QT延長	投与条件	-
	理由・原因	QT延長作用が相加的に増加	指示	注意

8. 薬剤名等：アドレナリン含有歯科麻酔剤

発現事象	重篤な血圧降下	投与条件	-
理由・原因	アドレナリンはアドレナリン作動性 α 、 β －受容体の刺激剤であり、本剤の α －受容体遮断作用により、 β －受容体の刺激作用が優位となり、血圧降下作用が増強	指示	注意



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.