

商品名 ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	1190 その他の中枢神経系用薬	一般名	ドネペジル塩酸塩錠
英名	Donepezil hydrochloride	剤型	錠
薬価	35.90	規格	3mg 1錠
メーカー	陽進堂	毒劇区分	(劇)

ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」の効能・効果

(アルツハイマー型認知症における認知症症状、レビー小体型認知症における認知症症状)の進行抑制

ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症以外の認知症性疾患、レビー小体型認知症における全般臨床症状、レビー小体型認知症における行動障害、レビー小体型認知症における精神症状	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
3. レビー小体型認知症で日常生活動作が制限される錐体外路障害、レビー小体型認知症で薬物治療を要する程度の錐体外路障害、心筋梗塞、心筋症、心疾患、低カリウム血症、電解質異常、弁膜症、洞不全症候群、房室接合部伝導障害、心房内伝導障害、消化性潰瘍の既往、気管支喘息の既往、閉塞性肺疾患の既往、錐体外路障害、パーキンソン症候群、パーキンソン病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」の副作用等

1. 消化器系副作用	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 寡動、運動失調、ジスキネジア、ジストニア、振戦、不随意運動、歩行異常、姿勢異常、言語障害、錐体外路障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 心室頻拍、Torsade de pointes、心室細動、洞不全症候群、洞停止、高度徐脈、心停止、十二指腸潰瘍穿孔、肝炎、黄疸、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、急性腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

4. QT延長、心ブロック、洞房ブロック、房室ブロック、失神、肝機能障害、脳性発作、てんかん、痙攣、寡動、運動失調、ジスキネジア、ジストニア、振戦、不随意運動、歩行異常、姿勢異常、言語障害、錐体外路障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
5. 心筋梗塞、心不全、消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、消化管出血、脳出血、脳血管障害、悪性症候群、Syndrome malin、無動緘黙、強度筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧変動、発汗、発熱、白血球増加、血清CK上昇、ミオグロビン尿、腎機能低下、呼吸困難、急性膵炎、急性腎障害、突然死、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
6. 悪夢、心房細動、尿閉、発汗、顔面浮腫、発熱、縮瞳	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
7. 過敏症、発疹、そう痒感、食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛、便秘、流涎、興奮、不穏、不眠、眠気、易怒性、幻覚、攻撃性、せん妄、妄想、多動、抑うつ、無感情、徘徊、振戦、頭痛、めまい、LDH上昇、AST上昇、ALT上昇、γ-GT上昇、Al-P上昇、動悸、血圧上昇、血圧低下、上室性期外収縮、心室性期外収縮、BUN上昇、尿失禁、頻尿、白血球減少、ヘマトクリット値減少、貧血、CK上昇、総コレステロール上昇、トリグリセライド上昇、アミラーゼ上昇、尿アミラーゼ上昇、倦怠感、むくみ、転倒、筋痛、体重減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
8. 嚥下障害、便失禁、リビドー亢進、多弁、躁状態、錯乱、昏迷、顔面紅潮、脱力感、胸痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
9. QT延長、心室頻拍、Torsade de pointes、心室細動、洞不全症候群、洞停止、高度徐脈、心ブロック、洞房ブロック、房室ブロック、徐脈、不整脈、出生率減少、死産仔頻度増加、生後体重増加抑制、高度嘔気、嘔吐、流涎、発汗、低血圧、呼吸抑制、虚脱、痙攣、縮瞳、コリン系副作用、筋脱力、呼吸筋弛緩、死亡	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ドネペジル塩酸塩錠3mg「YD」の相互作用

1. 薬剤名等：AChE阻害作用を有する同効薬	発現事象	-	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：スキサメトニウム塩化物水和物	発現事象	筋弛緩作用を増強	投与条件	-
	理由・原因	併用薬剤の脱分極性筋弛緩作用を増強	指示	注意
3. 薬剤名等：コリン賦活剤	発現事象	迷走神経刺激作用などコリン刺激作用が増強	投与条件	-
	理由・原因	本剤とともにコリン作動性の作用メカニズムを有している	指示	注意
4. 薬剤名等：コリンエステラーゼ阻害剤				

発現事象	迷走神経刺激作用などコリン刺激作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤とともにコリン作動性の作用メカニズムを有している	指示	注意

5. 薬剤名等：CYP3A阻害剤

発現事象	本剤の代謝を阻害し作用を増強	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）阻害作用	指示	注意

6. 薬剤名等：プロモクリプチンメシル酸塩

発現事象	本剤の代謝を阻害し作用を増強	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）阻害作用	指示	注意

7. 薬剤名等：イストラデフィリン

発現事象	本剤の代謝を阻害し作用を増強	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）阻害作用	指示	注意

8. 薬剤名等：キニジン硫酸塩水和物等

発現事象	本剤の代謝を阻害し作用を増強	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP2D6）阻害作用	指示	注意

9. 薬剤名等：カルバマゼピン

発現事象	本剤の代謝を促進し作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）の誘導	指示	注意

10. 薬剤名等：デキサメタゾン

発現事象	本剤の代謝を促進し作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）の誘導	指示	注意

11. 薬剤名等：フェニトイン

発現事象	本剤の代謝を促進し作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）の誘導	指示	注意

12. 薬剤名等：フェノバルビタール

発現事象	本剤の代謝を促進し作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）の誘導	指示	注意

13. 薬剤名等：リファンピシン等

発現事象	本剤の代謝を促進し作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	併用薬剤のチトクロームP450（CYP3A4）の誘導	指示	注意

14. 薬剤名等：中枢性抗コリン剤

発現事象	互いに干渉しそれぞれの効果を減弱
理由・原因	本剤と抗コリン剤の作用が、相互に拮抗

投与条件	-
指示	注意

15. 薬剤名等：アトロピン系抗コリン剤

発現事象	互いに干渉しそれぞれの効果を減弱
理由・原因	本剤と抗コリン剤の作用が、相互に拮抗

投与条件	-
指示	注意

16. 薬剤名等：非ステロイド性消炎鎮痛剤

発現事象	消化性潰瘍
理由・原因	コリン系の賦活により胃酸分泌が促進

投与条件	-
指示	注意

