

## 商品名 リドカイン塩酸塩注2%「日新」 医薬品基本情報

薬効	1214 キシリジン系製剤	一般名	リドカイン塩酸塩注射液
英名	Lidocaine hydrochloride NISSIN	剤型	注射液
薬価	100.00	規格	2% 10mL 1管
メーカー	日新製薬	毒劇区分	(劇)

### リドカイン塩酸塩注2%「日新」の効能・効果

浸潤麻酔、伝達麻酔、表面麻酔、硬膜外麻酔

### リドカイン塩酸塩注2%「日新」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ショック状態、大量出血、注射部位又はその周辺に炎症、敗血症  
記載場所 使用上の注意  
注意レベル 禁止
2. 呼吸器疾患、肥満、全身状態不良、心刺激伝導障害、髄膜炎、中枢神経系疾患、灰白脊髄炎、脊髄に結核、脊髄に腫瘍、脊椎に結核、脊椎に腫瘍、脊髄ろう、血液凝固障害、抗凝血薬投与中、脊柱に著明な変形、腹部腫瘍、重篤な高血圧症、心血管系に著しい障害、心弁膜症、重篤な腎機能障害、重篤な肝機能障害、ポルフィリン症  
記載場所 使用上の注意  
注意レベル 注意

### リドカイン塩酸塩注2%「日新」の副作用等

1. ショック、徐脈、不整脈、血圧低下、呼吸抑制、チアノーゼ、意識障害、心停止、アナフィラキシーショック、振戦、痙攣、中毒症状、一過性異常感覚、持続的異常感覚、疼痛、知覚障害、運動障害、膀胱直腸障害、神経学的疾患、頻脈、血圧変動、急激な体温上昇、筋強直、血液暗赤色化、過呼吸、発汗、アシドーシス、高カリウム血症、ミオグロビン尿、ポートワイン色尿、重篤な悪性高熱  
記載場所 重大な副作用  
頻度 頻度不明
2. 眠気、不安、興奮、霧視、眩暈、ショック、中毒、悪心、嘔吐、過敏症、蕁麻疹、皮膚症状、浮腫  
記載場所 その他の副作用  
頻度 頻度不明
3. 過度の血圧低下、化膿性髄膜炎症状、敗血症性髄膜炎、ショック、中毒症状、徐脈、呼吸抑制、神経障害、持続性眼筋運動障害、一過性失明、心肺停止、血腫、脊髄障害、脊髄損傷、神経根損傷、血圧低下、中毒、中枢神経系症状、心血管系症状、不安、興奮、多弁、口周囲知覚麻痺、舌のしびれ、ふらつき、聴覚過敏、耳鳴、視覚障害、振戦、意識消失、全身痙攣、低酸素血症、高炭酸ガス血症、呼吸停止、心筋収縮力低下、心拍出量低下、刺激伝導系抑制、心室性頻脈、心室細動、心室性不整脈、循環虚脱、心停止、痙攣、急性腹症、四肢麻痺、意識障害、軟骨融解  
記載場所 使用上の注意  
頻度 頻度不明

## リドカイン塩酸塩注2%「日新」の相互作用

1. 薬剤名等 : 抗凝血薬投与中

発現事象 血腫、脊髄障害

理由・原因 出血しやすい

投与条件 硬膜外麻酔

指示 注意

2. 薬剤名等 : クラス3抗不整脈剤

発現事象 心機能抑制作用が増強

理由・原因 作用が増強

投与条件 -

指示 注意

