

商品名 ベサコリン散5% 医薬品基本情報

薬効	1231 四級アンモニウム塩製剤	一般名	ベタネコール塩化物散
英名	Besacolin	剤型	散
薬価	8.80	規格	5% 1g
メーカー	アルフレッサ ファーマ	毒劇区分	(劇)

ベサコリン散5%の効能・効果

(慢性胃炎、麻痺性イレウス、迷走神経切断後、手術後の腸管麻痺、分娩後の腸管麻痺)の消化管機能低下、(神経因性膀胱、手術後、低緊張性膀胱、分娩後)の(尿閉、排尿困難)

ベサコリン散5%の使用制限等

1. 甲状腺機能亢進症、気管支喘息、消化管閉塞、膀胱頸部閉塞、消化性潰瘍、冠動脈閉塞、強度の徐脈、てんかん、パーキンソニズム	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止

ベサコリン散5%の副作用等

1. コリン作動性クリーゼ、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、唾液分泌過多、発汗、徐脈、血圧低下、縮瞳、呼吸不全	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 胸内苦悶、胃部不快感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 心悸亢進、胸やけ、悪心、嘔吐、唾液分泌過多、腹痛、下痢、頭痛、過敏症、発熱、発汗、顔面潮紅	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 心房細動、消化管通過障害、排尿障害、発汗、潮紅、下痢、悪心、嘔吐	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明


ベサコリン散5%の相互作用

- 薬剤名等：コリン作動薬

発現事象	本剤のコリン作動性作用に基づく副作用＜発汗・顔面潮紅等＞を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤のコリン作動性作用を増強	指示	注意

2. 薬剤名等：コリンエステラーゼ阻害薬

発現事象	本剤のコリン作動性作用に基づく副作用＜発汗・顔面潮紅等＞を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤のコリン作動性作用を増強	指示	注意



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.