

商品名 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 医薬品基本情報

薬効	1249 その他の鎮けい剤	一般名	エペリゾン塩酸塩50mg錠
英名	Eperisone hydrochloride TOWA	剤型	錠
薬価	6.10	規格	50mg 1錠
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」の効能・効果

(肩関節周囲炎、腰痛症、頸肩腕症候群)の筋緊張状態の改善、(SMON、筋萎縮性側索硬化症、スモン、脊髄血管障害、脊髄腫瘍術後後遺症、脊髄小脳変性症、脊髄損傷後遺症、頭部外傷後遺症、脳血管障害、脳腫瘍術後後遺症、脳性小児麻痺、脳脊髄疾患、頸部脊椎症、外傷後遺症、術後後遺症、痙性脊髄麻痺)の痙性麻痺

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、発赤、そう痒感、蕁麻疹、顔面浮腫、浮腫、呼吸困難、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、紅斑、水疱、眼充血、口内炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、多形滲出性紅斑、しゃっくり	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 発疹、眠気、不眠、頭痛、四肢のしびれ、悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、便秘、口渇、脱力感、ふらつき、全身倦怠感、ほてり	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、蛋白尿、BUN上昇、貧血、そう痒、体のこわばり、四肢のふるえ、口内炎、腹部膨満感、尿閉、尿失禁、残尿感、筋緊張低下、めまい、発汗、浮腫、動悸	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. 脱力感、ふらつき、眠気

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」の相互作用


1. 薬剤名等：メトカルバモール

発現事象	類似薬のトルペリゾン塩酸塩で眼の調節障害
------	----------------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.