

商品名 ロートエキス散「司生堂」 医薬品基本情報

薬効	1249 その他の鎮けい剤	一般名	ロートエキス散
英名	Scopolia extract powder	剤型	散
薬価	7.70	規格	1g
メーカー	司生堂製薬	毒劇区分	(劇)

ロートエキス散「司生堂」の効能・効果

(胃炎、胃潰瘍、胃酸過多、十二指腸潰瘍、痙攣性便秘)の(運動亢進、疼痛、分泌亢進)

ロートエキス散「司生堂」の使用制限等

1. 緑内障、前立腺肥大による排尿障害、重篤な心疾患、麻痺性イレウス	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 前立腺肥大、うっ血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与

ロートエキス散「司生堂」の副作用等

1. 散瞳、羞明、霧視、眼調節障害、口渇、悪心、嘔吐、便秘、排尿障害、頭痛、頭重感、眩暈、頻脈、過敏症状、顔面紅潮	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 中毒性巨大結腸、体温調節を障害、口渇、排尿困難、便秘、頻脈、乳汁分泌抑制	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ロートエキス散「司生堂」の相互作用

1. 薬剤名等 : 三環系抗うつ剤	発現事象	抗コリン作用<口渇・眼の調節障害・便秘・排尿困難等>が増強	投与条件	-
	理由・原因	本剤の作用が増強	指示	注意
2. 薬剤名等 : フェノチアジン系薬剤				

発現事象 抗コリン作用＜口渇・眼の調節障害・便秘・排尿困難等＞が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤の作用が増強

指示 注意

3. 薬剤名等：MAO阻害剤

発現事象 抗コリン作用＜口渇・眼の調節障害・便秘・排尿困難等＞が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤の作用が増強

指示 注意

4. 薬剤名等：抗ヒスタミン剤

発現事象 抗コリン作用＜口渇・眼の調節障害・便秘・排尿困難等＞が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤の作用が増強

指示 注意

5. 薬剤名等：イソニアジド

発現事象 抗コリン作用＜口渇・眼の調節障害・便秘・排尿困難等＞が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤の作用が増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』