

商品名 ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 医薬品基本情報

薬効	1315 眼科用コルチゾン製剤	一般名	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液
英名	Betamethasone sodium phosphate PF NITTEN	剤型	液
薬価	32.20	規格	0.1% 1mL
メーカー	ロートニッテン	毒劇区分	

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」の効能・効果

(外眼部、前眼部)の炎症性疾患の対症療法、(角膜炎、眼瞼炎、強膜炎、結膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜炎、眼科術後炎症)の対症療法、(中耳、外耳、上気道)の(アレルギー性疾患、炎症性疾患)、アレルギー性鼻炎、外耳炎、中耳炎、耳鼻科術後の処置

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 角膜潰瘍、角膜上皮剥離、化膿性眼疾患、結核性眼疾患、真菌性眼疾患、ウイルス性角膜疾患、ウイルス性結膜疾患、耳に結核性疾患、鼻にウイルス性疾患、鼻に結核性疾患、耳にウイルス性疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 糖尿病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」の副作用等

1. 角膜ヘルペス、角膜真菌症、眼部緑膿菌感染症、角膜穿孔	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 眼圧亢進、緑内障、後囊白内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満

3. 角膜沈着物、化膿性感染症、下垂体・副腎皮質系機能抑制、クッシング症候群、創傷治癒遅延	記載場所 その他の副作用
	頻度 頻度不明
4. 過敏症、刺激感、全身使用の場合と同様な症状	記載場所 その他の副作用
	頻度 0.1%未満
5. 全身性作用、クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児成長遅延、骨密度低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網脈絡膜症	記載場所 使用上の注意
	頻度 頻度不明
6. 全身性作用	記載場所 使用上の注意
	頻度 頻度不明
7. 眼圧亢進、緑内障	記載場所 使用上の注意
	頻度 頻度不明

