

商品名 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 医薬品基本情報

薬効	1319 その他の眼科用剤	一般名	アフリベルセプト（遺伝子組換え）キット
英名	Eylea	剤型	キット類
薬価	137292.00	規格	2mg 0.05mL 1筒
メーカー	バイエル薬品	毒劇区分	(劇)

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLの効能・効果

中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管、糖尿病黄斑浮腫、血管新生緑内障

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、眼に感染又はその恐れ・疑い、眼周囲に感染又はその恐れ・疑い、眼内に重度炎症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 不可逆的な虚血性視機能喪失の臨床的徴候が認められる網膜中心静脈閉塞症	記載場所	効能・効果
	注意レベル	希望禁止
3. 前緑内障	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
4. 高眼圧症、緑内障、脳卒中の既往、一過性脳虚血発作の既往、脳卒中の危険因子のある	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLの副作用等

1. 眼内炎、眼圧上昇、硝子体はく離、外傷性白内障、網膜出血、網膜色素上皮裂孔、硝子体出血、脳卒中	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
2. 網膜はく離、網膜裂孔、網膜色素上皮はく離	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満

3. 結膜出血、眼痛

記載場所	その他の副作用
------	---------

4. 眼充血、白内障、角膜擦過傷、角膜浮腫、角膜びらん、角膜上皮欠損、角膜障害、角膜炎、前房内細胞、前房フレア、結膜充血、結膜刺激、結膜浮腫、結膜炎、アレルギー性結膜炎、後のう部混濁、虹彩毛様体炎、ブドウ膜炎、前房蓄膿、虹彩炎、前房出血、点状角膜炎、硝子体浮遊物、硝子体細胞、硝子体混濁、黄斑線維症、黄斑浮腫、黄斑円孔、黄斑部瘢痕、網膜変性、網膜浮腫、網膜下線維症、網膜色素脱失、網膜色素上皮症、網膜分離症、硝子体炎、注射部位疼痛、注射部位刺激感、注射部位紅斑、注射部位不快感、注射部位乾燥、注射部位炎症、注射部位浮腫、注射部位腫脹、注射部位血腫、注射部位出血、眼異物感、眼刺激、流涙増加、眼脂、眼乾燥、眼そう痒症、眼異常感、眼瞼浮腫、眼瞼縁痂皮、眼瞼痛、眼瞼炎、眼窩周囲血腫、眼部腫脹、高眼圧症、羞明、視力障害、変視症、光視症、処置による眼疼痛、視力低下、霧視、眼部不快感、皮膚そう痒症、紅斑、高血圧、収縮期血圧上昇、会話障害、頭痛、悪心、タンパク尿、尿中タンパク／クレアチニン比増加、不快感、鼻出血、薬物過敏症、針恐怖

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

5. 眼内炎、結膜出血、眼痛、硝子体浮遊物、胎仔奇形、母動物体重減少、流産、着床後胚死亡、外表奇形、内臓奇形、骨格奇形、一過性眼圧上昇、抗アフリベルセプト抗体発現、鼻粘膜びらん、鼻甲介呼吸上皮びらん、鼻粘膜潰瘍、鼻甲介呼吸上皮潰瘍

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

6. 動脈血栓塞栓、心筋梗塞、脳卒中、血管死

記載場所	使用上の注意
頻度	5%未満



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』