

商品名 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 医薬品基本情報

薬効	1319 その他の眼科用剤	一般名	カルテオロール塩酸塩液（2）
英名	Carteolol hydrochloride LA WAKAMOTO	剤型	液
薬価	148.60	規格	2% 1mL
メーカー	わかもと製薬	毒劇区分	

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」の効能・効果

高眼圧症、緑内障

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、気管支痙攣又はその既往、気管支喘息又はその既往、重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、心原性ショック、洞性徐脈、房室ブロック＜2・3度＞	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肺高血圧による右心不全、うっ血性心不全、コントロール不十分な糖尿病、代謝性アシドーシス、糖尿病性ケトアシドーシス、食事摂取不良状態の患児、体調不良状態の患児	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」の副作用等

1. 喘息発作、咳、呼吸困難、高度徐脈、失神、房室ブロック、洞不全症候群、洞停止、徐脈性不整脈、うっ血性心不全、冠攣縮性狭心症、眼類天疱瘡、結膜充血、角膜上皮障害、乾性角結膜炎、結膜萎縮、睫毛内反、眼瞼眼球癒着、脳虚血、脳血管障害、全身性エリテマトーデス	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 眼刺激症状、眼がしみる感じ、眼疼痛、眼灼熱感、眼のかゆみ、眼乾燥感	記載場所	その他の副作用
3. 眼底黄斑部浮腫、眼底黄斑部混濁、低血圧、不整脈、動悸、胸痛、鼻症状、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、咽喉頭症状、咽喉頭違和感、血糖値低下、筋肉痛、こわばり、四肢のこわばり、脱力感、抑うつ、重症筋無力症増悪	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 霧視、眼異物感、眼脂、結膜炎、眼瞼炎、眼瞼腫脹、羞明感、角膜障害、角膜炎、角膜びまん性混濁、角膜びらん、視力異常、眼瞼発赤、徐脈、呼吸困難、頭痛、不快感、倦怠感、めまい、悪心、味覚異常、苦味、皮膚炎、発疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. β 遮断剤全身投与時と同様の副作用、心筋収縮力の抑制を増強、低血糖症状、意識障害、痙攣、低血糖

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」の相互作用

1. 薬剤名等： β 遮断剤

発現事象	全身的な β 遮断作用が増強
理由・原因	相加的に β 遮断作用を増強

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤

発現事象	過剰の交感神経抑制
理由・原因	相加的に交感神経抑制作用を増強

投与条件	-
指示	注意

3. 薬剤名等：カルシウム拮抗剤

発現事象	徐脈・房室ブロック等の伝導障害、うっ血性心不全
理由・原因	相互に作用が増強

投与条件	-
指示	注意

4. 薬剤名等：アドレナリン

発現事象	類薬〈チモロールマレイン酸塩点眼液〉でアドレナリンの散瞳作用が助長
理由・原因	アドレナリンの β 作用のみが遮断され、 α 作用が優位になる

投与条件	-
指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』