

商品名 ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 医薬品基本情報

薬効	1319 その他の眼科用剤	一般名	ラタノプロスト0.005%1mL点眼液
英名	Latanoprost TOA	剤型	液
薬価	151.00	規格	0.005% 1mL
メーカー	東亜薬品	毒劇区分	

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」の効能・効果

高眼圧症、緑内障

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 褐色を基調とする虹彩、無水晶体眼、眼内レンズ挿入眼、気管支喘息又はその既往、眼内炎、虹彩炎、ぶどう膜炎、ヘルペスウイルスが潜在又はその恐れ・疑い、閉塞隅角緑内障	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」の副作用等

1. 虹彩色素沈着	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
2. 結膜充血	記載場所	その他の副作用
3. 偽眼類天疱瘡、虹彩嚢腫、ヘルペス性角膜炎、角膜沈着物、角膜混濁、潰瘍性角膜炎、眼瞼溝深化、嚢胞様黄斑浮腫、黄斑浮腫、視力低下、眼接触性皮膚炎、羞明、動悸、狭心症、喘息、筋肉痛、関節痛、発疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 結膜炎、眼脂、結膜濾胞、ぶどう膜炎、虹彩炎、角膜上皮障害、点状表層角膜炎、糸状角膜炎、角膜びらん、角膜浮腫、眼瞼色素沈着、眼瞼炎、眼瞼部多毛、眼瞼浮腫、眼瞼発赤、眼がしみる、眼刺激症状、眼そう痒感、眼痛、霧視、前房細胞析出、流涙、睫毛異常、睫毛が濃くなる、睫毛が太くなる、睫毛が長くなる、眼異物感、眼異常感、頭痛、そう痒感、咽頭違和感、嘔気、めまい、胸痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 虹彩色素沈着、虹彩メラニン増加、虹彩色調変化、左右眼で虹彩の色調に差が生じる、嚢胞様黄斑浮腫、黄斑浮腫、視力低下、眼圧上昇、流産、後期吸収胚、胎仔体重減少、網膜動脈閉塞、網膜剥離、糖尿病性網膜症、硝子体出血、上気道感染症、感冒、インフルエンザ、筋肉痛、関節痛、腰痛、胸痛、狭心症、皮疹、アレルギー性皮膚反応、一過性気道抵抗増加

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」の相互作用

1. 薬剤名等：プロスタグランジン系点眼薬

発現事象 眼圧上昇

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.