

商品名 タブコム配合点眼液 医薬品基本情報

薬効	1319 その他の眼科用剤	一般名	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液
英名	Tapcom	剤型	液
薬価	630.50	規格	1mL
メーカー	参天製薬	毒劇区分	(劇)

タブコム配合点眼液の効能・効果

高眼圧症、緑内障

タブコム配合点眼液の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、気管支喘息又はその既往、気管支痙攣、重篤な慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全、心原性ショック、洞性徐脈、房室ブロック<2・3度>、オミデネパグ イソプロピル投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 無水晶体眼	記載場所	その他の副作用
	注意レベル	注意
3. 肺高血圧による右心不全、うっ血性心不全、代謝性アシドーシス、糖尿病性ケトアシドーシス、コントロール不十分な糖尿病、無水晶体眼、眼内レンズ挿入眼、眼内炎、虹彩炎、ぶどう膜炎、閉塞隅角緑内障	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

タブコム配合点眼液の副作用等

1. 虹彩色素沈着、眼類天疱瘡、結膜充血、角膜上皮障害、乾性角結膜炎、結膜萎縮、睫毛内反、眼瞼眼球癒着、気管支痙攣、呼吸困難、呼吸不全、心ブロック、うっ血性心不全、心停止、脳虚血、脳血管障害、全身性エリテマトーデス	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 睫毛異常、睫毛が長くなる、睫毛が太くなる、睫毛が多くなる、結膜充血、点状角膜炎、角膜上皮障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 角膜知覚低下、複視、結膜浮腫、眼異常感、眼違和感、目のねばつき感、眼乾燥感、視力低下、視力障害、眼底黄斑部浮腫、眼底黄斑部混濁、眼瞼下垂、眼脂、羞明、流涙増加、霧視、黄斑浮腫、失神、浮腫、レイノー現象、四肢冷感、動悸、徐脈、不整脈、低血圧、抑うつ、重症筋無力症増悪、悪夢、感覚異常、めまい、不眠、下痢、消化不良、悪心、口渇、腹痛、紅斑、脱力感、耳鳴、不快、胸部圧迫感、倦怠感、咳、筋肉痛、尿蛋白陽性、血清カリウム上昇、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、好酸球増加、尿酸上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

4. 眼瞼色素沈着、眼そう痒感、眼刺激、眼瞼炎、乾性角結膜炎、眼瞼部多毛、結膜下出血、結膜炎、眼異物感、眼痛、上眼瞼溝深化、虹彩炎、眼重感、頭痛、発疹、尿糖陽性、白血球数減少
5. 喘息発作、喘息発作増悪、 β 遮断剤全身投与時と同様の副作用、虹彩色調変化、眼瞼色調変化、眼周囲多毛化、左右眼で虹彩の色調に差が生じる、角膜上皮障害、点状表層角膜炎、糸状角膜炎、角膜びらん、心筋収縮力の抑制を増強、嚢胞様黄斑浮腫、黄斑浮腫、視力低下、眼圧上昇、催奇形性、着床後胚死亡率増加、胎仔の発育に対する影響、胎仔体重低値、胎仔胸骨未骨化、流産、黄体数減少、着床数減少、母動物哺育不良、出生仔4日生存率低値、子宮収縮作用、骨化遅延、死亡胎仔数増加

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

タブコム配合点眼液の相互作用

1. 薬剤名等：オミデネパグ イソプロピル

発現事象	中等度以上の羞明、虹彩炎等の眼炎症
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

2. 薬剤名等：アドレナリン

発現事象	散瞳作用が助長
理由・原因	-

投与条件	-
指示	注意

3. 薬剤名等：ジピペフリン塩酸塩

発現事象	散瞳作用が助長
理由・原因	-

投与条件	-
指示	注意

4. 薬剤名等：カテコールアミン枯渇剤

発現事象	起立性低血圧、徐脈、低血圧、眩暈、失神、交感神経系に対し過剰の抑制
理由・原因	カテコールアミンの枯渇を起こす薬剤は、 β 遮断作用を相加的に増強

投与条件	-
指示	注意

5. 薬剤名等： β -遮断剤

発現事象	眼圧下降あるいは β 遮断剤の全身的な作用が増強
理由・原因	作用が相加的にあらわれる

投与条件	-
指示	注意

6. 薬剤名等：カルシウム拮抗剤

発現事象	低血圧、左室不全、房室伝導障害
理由・原因	相互に作用が増強

投与条件	-
指示	注意

7. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	心刺激伝導障害＜徐脈・房室ブロック等＞	投与条件	-
理由・原因	相加的に作用（心刺激伝導抑制作用）を増強	指示	注意

8. 薬剤名等：CYP2D6阻害作用を有する薬剤

発現事象	β －遮断作用＜例えば心拍数減少・徐脈＞が増強	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤は本剤の代謝酵素であるP450（CYP2D6）を阻害し、本剤の血中濃度が上昇	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』