

商品名 ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」 医薬品基本情報

薬効	2119 その他の強心剤	一般名	ドブタミン塩酸塩キット
英名	Dobutamine	剤型	キット類
薬価	1689.00	規格	0.1% 200mL 1袋
メーカー	ヴィアトリス・ヘルスケア	毒劇区分	(劇)

ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」の効能・効果

急性循環不全の心収縮力増強、心エコー図検査の負荷

ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」の使用制限等

1. 肥大型閉塞性心筋症、特発性肥厚性大動脈弁下狭窄、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、急性心筋梗塞後早期、不安定狭心症、左冠動脈主幹部狭窄、重症心不全、重症頻拍性不整脈、急性心膜炎、急性心筋炎、急性心内膜炎、大動脈解離、重篤な血管病変、コントロール不良の高血圧症、褐色細胞腫、パラガングリオーマ、高度伝導障害、収縮性心膜炎、心タンポナーデ、心室充満障害、循環血液量減少症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 開心術後に心拍数が多い小児等	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 過度の血圧低下を伴う急性循環不全、重篤な冠動脈疾患、高血圧症、高度大動脈弁狭窄、重篤な血流閉塞、心房細動、境界型糖尿病、糖尿病、重篤な心疾患、新生児の重篤な心疾患、乳幼児の重篤な心疾患、高齢者の重篤な心疾患、重症心臓弁膜症、心筋炎、心膜炎、心内膜炎	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」の副作用等

1. 心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ストレス心筋症、心室性期外収縮、ST上昇、壁運動異常、心室基部過収縮、心尖部広範囲におよぶ収縮低下	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 不整脈、頻脈、期外収縮	記載場所	その他の副作用

4. 血圧低下、血清カリウム低下	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 過度の血圧上昇、動悸、胸部不快感、狭心痛、前胸部熱感、息切れ、悪心、腹部痛、発赤、腫脹、頭痛、発疹、好酸球増多	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞、重篤な胸痛、不整脈、高血圧、低血圧	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 心停止、心筋梗塞、ストレス心筋症、心室頻拍、心室細動、不整脈、急激な血圧変動	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 致死的な心破裂、過度の心拍数増加、過度の収縮期血圧上昇、耐性、過度の頻拍、食欲不振、悪心、嘔吐、動悸、息切れ、胸痛、血圧上昇、頻拍性不整脈、心筋虚血、心室細動、低血圧、重症の心室性頻拍性不整脈、発赤、腫脹、壊死	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」の相互作用

1. 薬剤名等： β 遮断剤

発現事象	本剤の効果の減弱、末梢血管抵抗の上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤の β 受容体刺激作用が遮断され、 α 受容体刺激作用があらわれる	指示	注意

2. 薬剤名等：最近に β 遮断剤の投与を受けていた

発現事象	本剤の効果の減弱、末梢血管抵抗の上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤の β 受容体刺激作用が遮断され、 α 受容体刺激作用があらわれる	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』