

商品名 アデール点滴静注用5mg 医薬品基本情報

薬効	2119 その他の強心剤	一般名	コルホルシンドロパート塩酸塩注射用
英名	Adehl	剤型	注射用
薬価	3696.00	規格	5mg 1瓶
メーカー	日本化薬	毒劇区分	(毒)

アデール点滴静注用5mgの効能・効果

急性心不全

アデール点滴静注用5mgの使用制限等

1. 肥大型閉塞性心筋症、高度大動脈弁狭窄、高度僧帽弁狭窄	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重篤な頻脈性不整脈、重篤な冠動脈疾患、高度動脈硬化、僧帽弁狭窄、大動脈弁狭窄、心電図異常、心房細動、著しく血圧の低い、腎機能障害、重篤な肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

アデール点滴静注用5mgの副作用等

1. 動悸、頻脈、不整脈	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 心室細動	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 心室性頻拍	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. 動悸、頻脈、心室性期外収縮、LDH上昇、尿蛋白増加、血小板減少、頭痛、頭重感、熱感	記載場所	その他の副作用

5. 上室性頻拍、心房細動、心房粗動、血圧低下、悪心、嘔吐、直接ビリルビン上昇、総ビリルビン上昇、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、Al-P上昇、BUN上昇、血清クレアチニン上昇、尿酸上昇、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット値減少、白血球増加、リンパ球減少、尿ウロビリノーゲン増加、総蛋白減少、CK上昇、尿糖増加、全身倦怠感、呼吸困難、血清K低下

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

6. 過度の心拍数増加、過度の血圧低下、動悸、頻脈、不整脈、心室性頻拍、心房細動、出生仔体重減少、AST異常増加、ALT異常増加、劇症肝炎

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

アデール点滴静注用5mgの相互作用

1. 薬剤名等：カテコラミン系の強心薬

発現事象 心室性期外収縮等の不整脈の発現を助長

投与条件 -

理由・原因 ともに強心作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：PDE阻害薬

発現事象 心室性期外収縮等の不整脈の発現を助長

投与条件 -

理由・原因 ともに強心作用を有する

指示 注意

3. 薬剤名等：cAMP製剤

発現事象 心室性期外収縮等の不整脈の発現を助長

投与条件 -

理由・原因 ともに強心作用を有する

指示 注意

4. 薬剤名等：利尿薬

発現事象 心室性期外収縮等の不整脈の発現を助長

投与条件 -

理由・原因 利尿薬は電解質失調を引きおこし、不整脈を誘発

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』