

商品名 サンリズム注射液50 医薬品基本情報

薬効	2129 その他の不整脈用剤	一般名	ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液
英名	Sunrhythm	剤型	注射液
薬価	490.00	規格	50mg 5mL 1管
メーカー	第一三共	毒劇区分	(劇)

サンリズム注射液50の効能・効果

頻脈性不整脈＜心室性＞、頻脈性不整脈＜上室性＞

サンリズム注射液50の使用制限等

1. うっ血性心不全、高度洞房ブロック、高度房室ブロック	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 抗不整脈薬併用中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 発作性頻拍、Brugada症候群、心筋梗塞、心筋症、弁膜症、基礎心疾患、基礎心疾患があり心不全又はその恐れ・疑い、心筋梗塞があり心不全又はその恐れ・疑い、心筋症があり心不全又はその恐れ・疑い、弁膜症があり心不全又はその恐れ・疑い、心不全の既往、脚ブロック、刺激伝導障害＜高度房室ブロック・高度洞房ブロックを除く＞、洞房ブロック＜高度洞房ブロックを除く＞、房室ブロック＜高度房室ブロックを除く＞、著明な洞性徐脈、血清カリウム低下、遺伝性果糖不耐症、一時的ペースリング中、恒久的ペースメーカー使用中、腎機能障害、重篤な肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サンリズム注射液50の副作用等

1. 血中濃度が急激に上昇	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 心室細動、心室頻拍、Torsade de pointes、洞停止、完全房室ブロック、失神、心不全、ショック、心停止	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. ショック、急性腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 上室性期外収縮、QT延長、上室性頻拍、房室ブロック、心房粗動、嘔吐、クレアチニン上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. QRS幅増大、徐脈、心室性期外収縮、胸部不快感、胸痛、血圧低下、口渇、悪心、ふわふわ感、白血球数減少、白血球数増加、好酸球増加、リンパ球減少、リンパ球増加、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、過敏症、発疹、BUN上昇、尿蛋白陽性、全身倦怠感、CK上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. PQ延長、QRS幅増大、QT延長、徐脈、血圧低下、心電図変化顕在化、右脚ブロック顕在化、右側胸部誘導＜V1～V3＞のST上昇顕在化、心室細動、心室頻拍、心室性期外収縮、催不整脈作用、低血糖、肝不全、腎不全、異常、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、刺激伝導障害、著明なQRS幅増大、心停止、心不全、Torsade de pointes、洞停止、ショック、失神、循環器障害、構語障害、精神・神経障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

サンリズム注射液50の相互作用

1. 薬剤名等：抗不整脈薬併用中

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	慎重投与

2. 薬剤名等：リファンピシン

発現事象	本剤の作用を減弱	投与条件	-
理由・原因	リファンピシンによりチトクロームP450の産生が誘導され、本剤の代謝速度が促進し、血中濃度が低下	指示	注意

3. 薬剤名等：カルシウム拮抗薬

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	作用増強	指示	注意

4. 薬剤名等： β -受容体遮断薬

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	作用増強	指示	注意

5. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	作用増強	指示	注意

6. 薬剤名等：硝酸・亜硝酸エステル系薬剤

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	作用増強	指示	注意

7. 薬剤名等：セチリジン

発現事象	両剤の血中濃度が上昇し本剤の副作用が発現	投与条件	-
理由・原因	腎でのトランスポーターを介した排泄が競合	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.