

商品名 イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 医薬品基本情報

薬効	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	一般名	イミダプリル塩酸塩錠5mg錠
英名	Imidapril hydrochloride	剤型	錠
薬価	15.10	規格	5mg 1錠
メーカー	日医工	毒劇区分	

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」の効能・効果

腎実質性高血圧症、高血圧症、1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、血管浮腫の既往、遺伝性血管浮腫の既往、後天性血管浮腫の既往、特発性血管浮腫の既往、薬剤による血管浮腫の既往、デキストラン硫酸固定化セルロースを用いた吸着器によるアフエレーシス施行中、トリプトファン固定化PVAを用いた吸着器によるアフエレーシス施行中、ポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフエレーシス施行中、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた血液透析施行中、アリスキレンフマル酸塩投与中、サクビト ril バルサルタンナトリウム水和物投与中、サクビト ril バルサルタンナトリウム水和物投与中止から36時間以内	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 両側性腎動脈狭窄、片腎で腎動脈狭窄、高カリウム血症、eGFR<60mL／分／1.73m ² の腎障害でアリスキレンフマル酸塩併用	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 手術前24時間	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	希望禁止
4. 重篤な腎機能障害、クレアチニンクリアランスが30mL／分以下、血清クレアチニンが3mg／dL以上	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
5. 両側性腎動脈狭窄、片腎で腎動脈狭窄、高カリウム血症、腎機能障害、脳血管障害、アリスキレンフマル酸塩を併用	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
6. 腎機能障害、血清カリウム値が高くなりやすい、コントロール不良の糖尿病、血液透析中、嚴重な減塩療法中、重症高血圧症、利尿降圧剤投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」の副作用等

1. 過度の血圧低下、腎機能悪化	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 急性腎障害、腎機能障害増悪	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 呼吸困難、顔面腫脹、舌腫脹、声門腫脹、喉頭腫脹、血管浮腫、重篤な血小板減少、重篤な高カリウム血症、紅皮症、剥脱性皮膚炎、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、天疱瘡様症状、紅斑、水疱、そう痒、発熱、粘膜疹、汎血球減少、腭炎、血中アミラーゼ上昇、血中リパーゼ上昇	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板減少、白血球減少、好酸球増多、血清クレアチニン上昇、BUN上昇、蛋白尿、頭痛、ふらつき、眩暈、立ちくらみ、不眠、眠気、低血圧、動悸、咳、咽頭部違和感、咽頭部不快感、痰、嘔声、悪心、嘔気、嘔吐、胃部不快感、腹痛、食欲不振、下痢、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、黄疸、γ-GT P上昇、過敏症、発疹、そう痒、光線過敏症、蕁麻疹、血清カリウム上昇、耳鳴、味覚異常、口渇、CK上昇、CPK上昇、胸部不快感、疲労、倦怠感、浮腫、顔面潮紅、脱毛、しびれ、脱力感、低血糖	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 高カリウム血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 高カリウム血症、急速な腎機能悪化、血清カリウム値上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 呼吸困難、血管浮腫、ショック、アナフィラキシー、非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症、低血圧、急速に腎機能悪化、一過性の急激な血圧低下、脳梗塞、羊水過少症、死亡、腎不全、頭蓋形成不全、四肢拘縮、頭蓋顔面変形、肺低形成、奇形、胎児への影響、新生児への影響、肺形成不全、腎形成不全	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」の相互作用

1. 薬剤名等：サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物投与中止から36時間以内			
発現事象	血管浮腫	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：デキストラン硫酸固定化セルロースを用いた吸着器によるアフェレーシス施行			
発現事象	ショック	投与条件	-
理由・原因	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の産生が亢進、本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積	指示	禁止

3. 薬剤名等：トリプトファン固定化PVAを用いた吸着器によるアフエレーシス施行

発現事象	ショック	投与条件	-
理由・原因	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の産生が亢進、本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積	指示	禁止

4. 薬剤名等：ポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフエレーシス施行

発現事象	ショック	投与条件	-
理由・原因	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより血中キニン系の産生が亢進、本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積	指示	禁止

5. 薬剤名等：アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた透析

発現事象	アナフィラキシー	投与条件	-
理由・原因	多価イオン体であるAN69により血中キニン系の産生が亢進し、更に本剤によりブラジキニンの代謝が妨げられて、ブラジキニンが蓄積	指示	禁止

6. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	非致死性脳卒中・腎機能障害・高カリウム血症及び低血圧のリスク増加	投与条件	糖尿病患者に使用する場合（但し、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）
理由・原因	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	禁止

7. 薬剤名等：サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

発現事象	血管浮腫	投与条件	-
理由・原因	相加的にブラジキニンの分解を抑制し、血管浮腫のリスクを増加	指示	禁止

8. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	-	投与条件	eGFRが60mL／min／1.73m ² 未満の腎機能障害
理由・原因	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	原則禁止

9. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	高カリウム血症、低血圧、腎機能障害	投与条件	-
理由・原因	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	慎重投与

10. 薬剤名等：利尿降圧剤

発現事象	降圧作用が増強	投与条件	本剤を初めて投与
理由・原因	利尿剤の投与は血漿レニン活性を上昇させているため、本剤の投与により急激な血圧低下を起こす	指示	慎重投与

11. 薬剤名等：カリウム保持性利尿剤

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤はアンジオテンシン2産生を抑制し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少	指示	注意

12. 薬剤名等：カリウム補給剤

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	-
理由・原因	本剤はアンジオテンシン2産生を抑制し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少	指示	注意

13. 薬剤名等：アンジオテンシン2受容体拮抗剤

発現事象	高カリウム血症、低血圧、腎機能障害	投与条件	-
理由・原因	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	注意

14. 薬剤名等：リチウム製剤

発現事象	中毒＜眠気・振戦・錯乱等＞	投与条件	-
理由・原因	腎尿細管におけるリチウムの再吸収を促進	指示	注意

15. 薬剤名等：非ステロイド性抗炎症剤

発現事象	降圧作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用	指示	注意

16. 薬剤名等：非ステロイド性抗炎症剤

発現事象	腎機能を悪化	投与条件	-
理由・原因	非ステロイド性抗炎症剤のプロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下	指示	注意

17. 薬剤名等：カリジノゲナーゼ製剤

発現事象	過度の血圧低下	投与条件	-
理由・原因	本剤のキニン分解抑制作用とカリジノゲナーゼ製剤のキニン産生作用により、血管平滑筋の弛緩が増強	指示	注意

18. 薬剤名等： 降圧作用を有する薬剤

発現事象	降圧作用が増強
------	---------

投与条件	-
------	---

理由・原因	相加的に作用（降圧作用）を増強
-------	-----------------

指示	注意
----	----

19. 薬剤名等： インスリン

発現事象	アンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより低血糖
------	------------------------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----

20. 薬剤名等： 経口血糖降下剤

発現事象	アンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより低血糖
------	------------------------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.