

商品名 テルミサルタン錠40mg「武田テバ」 医薬品基本情報

薬効	2149 その他の血圧降下剤	一般名	テルミサルタン40mg錠
英名	Telmisartan TAKEDA TEVA	剤型	錠
薬価	10.40	規格	40mg 1錠
メーカー	武田テバ薬品	毒劇区分	

テルミサルタン錠40mg「武田テバ」の効能・効果

高血圧症

テルミサルタン錠40mg「武田テバ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重篤な肝障害、胆汁の分泌が極めて悪い、アリスキレンフマル酸塩投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 両側性腎動脈狭窄、片腎で腎動脈狭窄、高カリウム血症、eGFR<60mL／分／1.73m ² の腎障害でアリスキレンフマル酸塩併用	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 手術前24時間	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	希望禁止
4. 両側性腎動脈狭窄、片腎で腎動脈狭窄、高カリウム血症、肝障害、重篤な腎障害、血清クレアチニン値3.0mg／dL以上、脳血管障害、アリスキレンフマル酸塩を併用	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
5. 肝障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
6. 血液透析中、嚴重な減塩療法中、利尿降圧剤投与中	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
7. 腎機能障害、血清カリウム値が高くなりやすい、コントロール不良の糖尿病、血液透析中、嚴重な減塩療法中、利尿降圧剤投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

テルミサルタン錠40mg「武田テバ」の副作用等

1.

血管浮腫、顔面腫脹、口唇腫脹、咽頭腫脹、喉頭腫脹、舌腫脹、腫脹、喉頭浮腫、呼吸困難、重篤な高カリウム血症、腎機能障害、急性腎不全、ショック、血圧低下、失神、意識消失、冷感、嘔吐、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、肝機能障害、黄疸、低血糖、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害、アナフィラキシー、発熱、咳嗽、胸部X線異常、間質性肺炎、筋肉痛、CK上昇、CPK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症
2.

過敏症、そう痒、発疹、蕁麻疹、紅斑、眩暈、不安感、頭痛、眠気、頭のぼんやり感、不眠、抑うつ状態、白血球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少、貧血、好酸球上昇、低血圧、ほてり、心悸亢進、ふらつき、上室性期外収縮、心房細動、上室性頻脈、起立性低血圧、徐脈、腹痛、下痢、嘔気、食欲不振、消化不良、胃炎、口渇、口内炎、鼓腸、嘔吐、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、肝機能異常、咳、喀痰増加、咽頭炎、血清クレアチニン上昇、血中尿酸値上昇、関節痛、背部痛、下肢痙攣、下肢痛、筋肉痛、腱炎、血清カリウム上昇、低ナトリウム血症、耳鳴、倦怠感、CRP陽性、CK上昇、CPK上昇、浮腫、脱力感、発熱、頻尿、結膜炎、目のチカチカ感、羞明、視覚異常、多汗、胸痛、尿路感染、膀胱炎、敗血症、しびれ、味覚異常、上気道感染、インフルエンザ様症状
3.

高カリウム血症
4.

肝炎、重篤な肝障害
5.

非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症、低血圧、急速に腎機能悪化、急激な血圧低下、脳梗塞、羊水過少症、死亡、腎不全、頭蓋形成不全、四肢拘縮、頭蓋顔面奇形、肺発育不全、胎児への影響、新生児への影響、肺形成不全、腎形成不全、出生仔4日生存率低下、出生仔低体重、出生仔身体発達遅延、頻脈、眩暈

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

テルミサルタン錠40mg「武田テバ」の相互作用

1. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩投与中

発現事象	高カリウム血症、低血圧、腎機能障害、非致死性脳卒中	投与条件	糖尿病患者（但し、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）
理由・原因	-	指示	禁止

2. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	-	投与条件	eGFRが60mL／min／1.73m ² 未満の腎機能障害
理由・原因	レニン－アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	原則禁止

3. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	高カリウム血症、低血圧、腎機能障害	投与条件	-
理由・原因	レニン－アンジオテンシン系阻害作用が増強	指示	慎重投与

4. 薬剤名等：利尿降圧剤投与中

発現事象	急激な血圧低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

5. 薬剤名等：ジゴキシン

発現事象	血中ジゴキシン濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

6. 薬剤名等：カリウム保持性利尿剤

発現事象	血清カリウム濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

7. 薬剤名等：カリウム補給剤

発現事象	血清カリウム濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

8. 薬剤名等：リチウム製剤

発現事象	中毒	投与条件	-
理由・原因	ナトリウムイオン不足はリチウムイオンの貯留を促進するといわれているため、本剤がナトリウム排泄を促進することにより起こる	指示	注意

9. 薬剤名等：非ステロイド性抗炎症薬

発現事象	糸球体濾過量がより減少、腎障害のある患者では急性腎不全	投与条件	-
理由・原因	プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下	指示	注意

10. 薬剤名等：COX-2選択的阻害剤

発現事象	糸球体濾過量がより減少、腎障害のある患者では急性腎不全	投与条件	-
理由・原因	プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下	指示	注意

11. 薬剤名等：非ステロイド性抗炎症薬

発現事象 降圧薬の効果を減弱

投与条件 -

理由・原因 血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成が阻害

指示 注意

12. 薬剤名等：COX-2選択的阻害剤

発現事象 降圧薬の効果を減弱

投与条件 -

理由・原因 血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成が阻害

指示 注意

13. 薬剤名等：アンジオテンシン変換酵素阻害剤

発現事象 高カリウム血症、低血圧、急性腎不全を含む腎機能障害

投与条件 -

理由・原因 レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強

指示 注意



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.