

## 商品名 ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」 医薬品基本情報

|      |                              |      |              |
|------|------------------------------|------|--------------|
| 薬効   | 2160 血管収縮剤                   | 一般名  | ミドドリン塩酸塩2mg錠 |
| 英名   | Midodrine hydrochloride TEVA | 剤型   | 錠            |
| 薬価   | 6.10                         | 規格   | 2mg 1錠       |
| メーカー | 日医工岐阜工場                      | 毒劇区分 |              |

## ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」の効能・効果

起立性低血圧、本態性低血圧

## ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」の使用制限等

1. 甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、パラガングリオーマ

|       |        |
|-------|--------|
| 記載場所  | 使用上の注意 |
| 注意レベル | 禁止     |

2. 重篤な心臓障害、重篤な血管障害、閉塞性動脈硬化症、重篤な血管狭窄、高血圧、高血圧がある起立性低血圧、前立腺肥大に伴う排尿困難、重篤な腎機能障害

|       |        |
|-------|--------|
| 記載場所  | 使用上の注意 |
| 注意レベル | 注意     |

## ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」の副作用等

1. 下痢、異常感覚、排尿困難

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 頻度不明    |

2. 悪心、腹痛、頭痛

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 5%未満    |

3. 眠気、いらいら感、嘔吐、口内炎、腹部膨満感、便秘、高血圧、動悸、心室性期外収縮、めまい、発疹、立毛感、皮膚そう痒感、蕁麻疹、発赤、肝機能障害、ALT上昇、AST上昇、Al-P上昇、ほてり感、悪寒、倦怠感、頻尿、発汗亢進、肩こり

|      |         |
|------|---------|
| 記載場所 | その他の副作用 |
| 頻度   | 0.1%未満  |

4. 臥位血圧が過度に上昇、動悸、頭痛、過度の血圧上昇、吸収胚増加、胎仔体重低値、胎仔骨化遅延、死胚胎仔増加

|      |        |
|------|--------|
| 記載場所 | 使用上の注意 |
| 頻度   | 頻度不明   |



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.