

商品名 トラピジル錠100mg「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	2171 冠血管拡張剤	一般名	トラピジル100mg錠
英名	Trapidil	剤型	錠
薬価	5.90	規格	100mg 1錠
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

トラピジル錠100mg「サワイ」の効能・効果

狭心症

トラピジル錠100mg「サワイ」の使用制限等

1. 頭蓋内出血発作後止血が完成していない又はその恐れ・疑い、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 膠原病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	希望禁止
3. 肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

トラピジル錠100mg「サワイ」の副作用等

1. 皮膚粘膜眼症候群、Stevens－Johnson症候群、AST上昇、ALT上昇、γ－GTP上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、発赤、そう痒感、AST上昇、ALT上昇、総ビリルビン上昇、胃部膨満感、嘔吐、腹痛、下痢、口渇、口内炎、眠気、しびれ感、不眠、筋肉痛、関節痛、胸部圧迫感、心悸亢進、頻脈、徐脈、血圧低下、胸部不快感、不整脈、白血球減少、赤血球減少、血小板減少、好酸球増多、出血傾向、味覚異常、顔面潮紅、発熱、悪寒、戦慄、倦怠感、気分不良、発汗、女性化乳房、呼吸困難、リンパ節腫脹、疼痛、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 嘔気、食欲不振、胃重感、胃部不快感、便秘、頭痛、めまい、頭部不快感	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満


4. 胎仔発育遅延、重症ショック、昏睡状態、頻回の嘔吐、全身痙攣、血圧低下、呼吸困難、四肢冷感

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.