

商品名 シグマート注2mg 医薬品基本情報

薬効	2171 冠血管拡張剤	一般名	ニコランジル注射用
英名	Sigmart	剤型	注射用
薬価	156.00	規格	2mg 1瓶
メーカー	中外製薬	毒劇区分	

シグマート注2mgの効能・効果

不安定狭心症、急性心不全、慢性心不全の急性増悪期

シグマート注2mgの使用制限等

1. 重篤な肝機能障害、重篤な腎機能障害、重篤な脳機能障害、重篤な低血圧、心原性ショック、Eisenmenger症候群、原発性肺高血圧症、右室梗塞、脱水症状、神経循環無力症、閉塞隅角緑内障、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤投与中、グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 血圧低下又はその恐れ・疑い、低血圧＜重篤な低血圧を除く＞、肥大型閉塞性心筋症、大動脈弁狭窄症、左室流出路狭窄、腎機能障害＜重篤な腎機能障害を除く＞、肝機能障害＜重篤な肝機能障害を除く＞	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

シグマート注2mgの副作用等

1. AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 血圧低下、心拍数増加、心室性頻脈、頭痛、めまい、四肢のしびれ感、悪心、嘔吐、腹部不快感、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇、LDH上昇、血中ビリルビン増加、貧血、血小板減少、白血球数増加、過敏症、発疹、血中クレアチニン増加、尿中蛋白陽性、総蛋白減少、CK増加、血中カリウム増加、HDLコレステロール減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 重篤な血圧低下	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

4. 血圧低下、心拍出量減少、心原性ショック

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

シグマート注2mgの相互作用

1. 薬剤名等：ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤

発現事象 降圧作用が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤はcGMPの産生を促進し、一方、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤はcGMPの分解を抑制することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強

指示 禁止

2. 薬剤名等：グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤

発現事象 降圧作用が増強

投与条件 -

理由・原因 本剤とグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤は、ともにcGMPの産生を促進することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』