

## 商品名 ミオコールスプレー0.3mg 医薬品基本情報

|      |             |      |               |
|------|-------------|------|---------------|
| 薬効   | 2171 冠血管拡張剤 | 一般名  | ニトログリセリン噴霧剤   |
| 英名   | Myocor      | 剤型   | 噴霧剤           |
| 薬価   | 1053.20     | 規格   | 0.65% 7.2g 1缶 |
| メーカー | トーアエイヨー     | 毒劇区分 | (劇)           |

## ミオコールスプレー0.3mgの効能・効果

狭心症発作の寛解

## ミオコールスプレー0.3mgの使用制限等

|                                                                                                                                    |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. 重篤な低血圧、心原性ショック、閉塞隅角緑内障、頭部外傷、脳出血、高度貧血、<br>類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ホスホジエステ<br>ラーゼ5阻害作用を有する薬剤投与中、グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬<br>剤投与中 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                                                                                                                    | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 低血圧<重篤な低血圧を除く>、心筋梗塞の急性期、原発性肺高血圧症、肥大型閉<br>塞性心筋症、エタノールに過敏の既往                                                                      | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                                                                                                                    | 注意レベル | 注意     |

## ミオコールスプレー0.3mgの副作用等

|                                                                                                                |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. 血圧低下、ほてり、動悸、めまい、脳貧血、熱感、潮紅、頭痛、頭重感、失神、過<br>敏症、発疹、アフタ性口内炎、悪心、嘔吐、Al-P上昇、LDH上昇、舌刺激感<br>、舌痛、舌のしびれ、気分不良、発汗、尿失禁、便失禁 | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                                                | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. AST上昇、ALT上昇                                                                                                 | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                                                | 頻度   | 5%未満    |
| 3. 意識喪失、過度の血圧低下、起立性低血圧、頭痛、ショック、急激な血圧低下、過<br>度の血行動態変化、メトヘモグロビン血症                                                | 記載場所 | 使用上の注意  |
|                                                                                                                | 頻度   | 頻度不明    |

## ミオコールスプレー0.3mgの相互作用

- 薬剤名等：ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤

|       |                                                                                        |      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 降圧作用を増強                                                                                | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | 本剤はcGMPの産生を促進し、一方、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤はcGMPの分解を抑制することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強 | 指示   | 禁止 |

2. 薬剤名等：グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤

|       |                                                                            |      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 降圧作用を増強                                                                    | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | 本剤とグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤は、ともにcGMPの産生を促進することから、両剤の併用によりcGMPの増大を介する本剤の降圧作用が増強 | 指示   | 禁止 |

3. 薬剤名等：降圧作用及び血管拡張作用を有する薬物

|       |                 |      |    |
|-------|-----------------|------|----|
| 発現事象  | 血圧低下が増強、過度の血圧低下 | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | 血圧低下作用が相加的に増強   | 指示   | 注意 |

4. 薬剤名等：アルコール

|       |                 |      |    |
|-------|-----------------|------|----|
| 発現事象  | 血圧低下が増強、過度の血圧低下 | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | 血圧低下作用が相加的に増強   | 指示   | 注意 |

5. 薬剤名等：硝酸・亜硝酸エステル系薬剤

|       |                         |      |    |
|-------|-------------------------|------|----|
| 発現事象  | 過度の血圧低下、頭痛・血圧低下等の副作用が増強 | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | 血管拡張作用が増強               | 指示   | 注意 |



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』