商品名　ペリシット錠125mg 医薬品基本情報

薬効	2189 その他の高脂血症用剤	一般名	ニセリトロール錠
英名	Perycit	剤型	錠
薬価	5.90	規格	125mg 1錠
メーカー	三和化学研究所	毒劇区分	

ペリシット錠125mgの効能・効果

高脂質血症の改善、(ビュルガー病、閉塞性動脈硬化症、レイノー症候群、レイノー病)の末梢循環障害の改善

ペリシット錠125mgの使用制限等

1. 重症低血圧、動脈出血、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

2. 肝障害、透析療法、消化性潰瘍、耐糖能異常、痛風

記載場所	使用上の注意
注意レベル	慎重投与

ペリシット錠125mgの副作用等

1. 血小板減少

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

2. 口内炎、貧血、BUN上昇、クレアチニン上昇、高尿酸血症、CK上昇、CPK上昇

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

3. 過敏症、発疹、蕁麻疹、眩暈、食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、肝機能障害、血糖値上昇、潮紅、顔面潮紅、熱感、そう痒感

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

4. 頭痛、手足のしびれ、胸やけ、腹痛、心窩部痛、便秘、口渇、胃部不快感、胸部不快感、Al－P上昇、ピリピリ感、動悸、脱力感、浮腫

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満

5. 血小板減少、貧血

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ペリシット錠125mgの相互作用

1. 薬剤名等 ： HMG-CoA還元酵素阻害剤

発現事象	類薬＜ニコチン酸＞で併用により横紋筋融解症	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量
医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.