

商品名 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 医薬品基本情報

薬効	2190 その他の循環器官用薬	一般名	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー
英名	Calcium polystyrene sulfonate SANWA	剤型	ゼリー
薬価	77.80	規格	20% 25g 1個
メーカー	三和化学研究所	毒劇区分	

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」の効能・効果

(急性腎不全、慢性腎不全)の高カリウム血症

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」の使用制限等

1. 腸閉塞	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 便秘を起こし易い体質、腸管狭窄、消化管潰瘍、副甲状腺機能亢進症、多発性骨髄腫	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」の副作用等

1. 腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍、高度便秘、持続する腹痛、嘔吐、下血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 便秘	記載場所	その他の副作用
3. 過敏症、発疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 悪心、嘔気、食欲不振、胃部不快感、低カリウム血症	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍、高度便秘、持続する腹痛、嘔吐、下血、異常、血中カルシウム濃度上昇、結腸狭窄、結腸潰瘍、小腸穿孔、腸粘膜壊死、結腸壊死	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」の相互作用

1.	薬剤名等	ジギタリス剤		
	発現事象	中毒作用が増強	投与条件	-
	理由・原因	本剤の血清カリウム値低下作用	指示	注意
2.	薬剤名等	アルミニウムを含有する制酸剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
3.	薬剤名等	マグネシウムを含有する制酸剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
4.	薬剤名等	カルシウムを含有する制酸剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
5.	薬剤名等	アルミニウムを含有する緩下剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
6.	薬剤名等	マグネシウムを含有する緩下剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
7.	薬剤名等	カルシウムを含有する緩下剤		
	発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
	理由・原因	非選択的に併用薬剤の陽イオンと交換	指示	注意
8.	薬剤名等	アルミニウムを含有する制酸剤		
	発現事象	全身性アルカローシス	投与条件	-
	理由・原因	腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる	指示	注意
9.	薬剤名等	マグネシウムを含有する制酸剤		
	発現事象	全身性アルカローシス	投与条件	-
	理由・原因	腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる	指示	注意

10. 薬剤名等：カルシウムを含有する制酸剤

発現事象 全身性アルカローシス

投与条件 -

理由・原因 腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる

指示 注意

11. 薬剤名等：アルミニウムを含有する緩下剤

発現事象 全身性アルカローシス

投与条件 -

理由・原因 腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる

指示 注意

12. 薬剤名等：マグネシウムを含有する緩下剤

発現事象 全身性アルカローシス

投与条件 -

理由・原因 腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる

指示 注意

13. 薬剤名等：カルシウムを含有する緩下剤

発現事象 全身性アルカローシス

投与条件 -

理由・原因 腸管内に分泌された重炭酸塩の中和を妨げる

指示 注意

14. 薬剤名等：甲状腺ホルモン製剤

発現事象 効果が減弱

投与条件 -

理由・原因 本剤が消化管内で併用薬剤を吸着することにより、これらの薬剤の吸収を阻害

指示 注意

15. 薬剤名等：アルギン酸ナトリウム

発現事象 消化管内に不溶性のゲル

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

