

商品名 リズミック錠10mg 医薬品基本情報

薬効	2190 その他の循環器官用薬	一般名	アメジニウムメチル硫酸塩錠
英名	Risumic	剤型	錠
薬価	11.70	規格	10mg 1錠
メーカー	住友ファーマ	毒劇区分	

リズミック錠10mgの効能・効果

起立性低血圧、本態性低血圧、透析施行時の血圧低下の改善

リズミック錠10mgの使用制限等

1. 高血圧症、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、パラガングリオーマ、閉塞隅角緑内障、残尿を伴う前立腺肥大	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重篤な心臓障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

リズミック錠10mgの副作用等

1. 四肢冷感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 動悸、頻脈、血圧変動、不整脈、期外収縮、心房細動、ほてり感、のぼせた感じ、めまい、立ちくらみ、頭痛、頭重、気分不良、嘔気、嘔吐、腹痛、AST上昇、ALT上昇、肝機能異常、排尿障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 過敏症、発疹、湿疹、じん麻疹、胸部不快感、息苦しさ、浮腫、胸内苦悶感、ふらつき、全身倦怠感、焦燥感、情緒不安定、不眠、眠気、全身のしびれ、耳鳴、胸やけ、食欲不振、腹部膨満、下痢、便秘、口渇感、白血球減少、発熱、全身熱感、頸部痛、下肢痛、視力障害、歩行障害悪化、構語障害悪化	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
4. 急激な昇圧発作、尿閉	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

リズミック錠10mgの相互作用

1. 薬剤名等：ドロキシドパ

発現事象	血圧の異常上昇	投与条件	-
理由・原因	ドロキシドパから変換したノルアドレナリンの末梢神経終末における再取り込みと不活性化が、本剤により抑制	指示	注意

2. 薬剤名等：ノルアドレナリン

発現事象	血圧の異常上昇	投与条件	-
理由・原因	ノルアドレナリンの末梢神経終末における再取り込みと不活性化が、本剤により抑制	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版『DIR』