

商品名 フォスブロック錠250mg 医薬品基本情報

薬効	2190 その他の循環器官用薬	一般名	セベラマー塩酸塩錠
英名	Phosblock	剤型	錠
薬価	12.50	規格	250mg 1錠
メーカー	協和キリン	毒劇区分	

フォスブロック錠250mgの効能・効果

透析中の慢性腎不全の高リン血症の改善

フォスブロック錠250mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、腸閉塞	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 便秘、腸管狭窄、腸管憩室、腹部手術の既往、痔疾患、消化管潰瘍又はその既往、重度消化管運動障害、出血傾向、胃切除術の既往、腸切除術の既往、嚥下障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

フォスブロック錠250mgの副作用等

1. 便秘、便秘増悪、腹部膨満	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 腸管穿孔、腸閉塞、高度便秘、持続する腹痛、嘔吐	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 憩室炎、虚血性腸炎、腸管穿孔、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. 消化管出血、消化管潰瘍、吐血、下血、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、結腸潰瘍、直腸潰瘍、腹痛	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
5. 水分過負荷	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

6. 悪心、腹部不快感、下痢、軟便、消化不良、嘔吐、食欲不振、胃炎、胃炎増悪、痔核、おくび、嚥下障害、肝機能異常、ALT上昇、LDH上昇、総胆汁酸上昇、血中カルシウム減少、Al-P上昇、血中重炭酸塩減少、血液pH低下、ビタミンK上昇、ビタミンK減少、血中亜鉛減少、血中銅減少、ビタミンA上昇、低比重リポ蛋白減少、トリグリセリド上昇、PO2上昇、鉄代謝障害、貧血、皮膚そう痒症、発疹、上皮小体ホルモン上昇、関節痛

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

7. 腸管穿孔、腸閉塞、低カルシウム血症、過塩素血症性アシドーシス、脂溶性ビタミン＜A・D・E・K＞吸収阻害、葉酸塩吸収阻害、消化器症状、膀胱移行上皮乳頭腫、膀胱移行上皮癌

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

フォスブロック錠250mgの相互作用

1. 薬剤名等：抗てんかん剤

発現事象 吸収を遅延あるいは減少

投与条件 同時

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：不整脈用剤等

発現事象 吸収を遅延あるいは減少

投与条件 同時

理由・原因 -

指示 注意

3. 薬剤名等：シプロフロキサシン

発現事象 バイオアベイラビリティが低下

投与条件 同時

理由・原因 -

指示 注意

4. 薬剤名等：甲状腺ホルモン製剤

発現事象 甲状腺刺激ホルモン＜TSH＞濃度が上昇

投与条件 -

理由・原因 消化管内で併用薬剤と結合し、吸収を抑制

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』