

商品名 ピートルチュアブル錠250mg 医薬品基本情報

薬効	2190 その他の循環器官用薬	一般名	スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠
英名	P-Tol	剤型	錠
薬価	141.30	規格	250mg 1錠
メーカー	キッセイ薬品	毒劇区分	

ピートルチュアブル錠250mgの効能・効果

透析中の慢性腎臓病の高リン血症の改善

ピートルチュアブル錠250mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 赤血球造血刺激因子製剤と併用、胃腸疾患、炎症性腸疾患、消化性潰瘍、鉄過剰症、鉄過剰状態、鉄含有製剤投与中、発作性夜間血色素尿症、肝炎、C型慢性肝炎	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ピートルチュアブル錠250mgの副作用等

1. 下痢	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
2. 便秘、嘔吐、悪心、腹痛、腹部不快感、腹部膨満、胃腸炎、排便回数増加、血清フェリチン増加、AST上昇、ALT上昇、CK上昇、血中鉄増加、ヘモグロビン増加、発疹、そう痒症	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 鉄過剰	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
4. 過剰造血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
5. 低カルシウム血症、低カルシウム血症悪化、二次性副甲状腺機能亢進症、二次性副甲状腺機能亢進症悪化、溶血、結腸腺癌、結腸腺腫、甲状腺C細胞腺腫	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ピートルチュアブル錠250mgの相互作用

1. 薬剤名等：赤血球造血刺激因子製剤と併用

発現事象 過剰造血

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：鉄含有製剤投与中

発現事象 鉄過剰症を引き起こす

投与条件 -

理由・原因 鉄過剰症を引き起こす

指示 注意

3. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質

発現事象 作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤と結合し、吸収を減少

指示 注意

4. 薬剤名等：甲状腺ホルモン製剤

発現事象 作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤と結合し、吸収を減少

指示 注意

5. 薬剤名等：セフジニル

発現事象 作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤では、鉄剤との結合により、吸収が減少

指示 注意

6. 薬剤名等：抗パーキンソン剤

発現事象 作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤では、鉄剤との結合により、吸収が減少

指示 注意

7. 薬剤名等：エルトロンボパグ オラミン

発現事象 作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 これらの薬剤では、鉄剤との結合により、吸収が減少

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』