

商品名 カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」 医薬品基本情報

薬効	2233 システイン系製剤	一般名	L-カルボシステイン5%シロップ
英名	Carbocisteine TEVA	剤型	シロップ
薬価	2.70	規格	5% 1mL
メーカー	日医工岐阜工場	毒劇区分	

カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」の効能・効果

(咽頭炎、気管支拡張症、気管支喘息、急性気管支炎、喉頭炎、肺結核、慢性気管支炎、上気道炎)の去痰、慢性副鼻腔炎の排膿、滲出性中耳炎の排液

カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 心障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」の副作用等

1. 中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、肝機能障害、黄疸、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、浮腫、蕁麻疹	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、浮腫、発熱、呼吸困難	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 食欲不振、下痢、腹痛、発疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 悪心、嘔吐、腹部膨満感、口渇、湿疹、紅斑、そう痒感	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.