

商品名 ブリカニール錠2mg 医薬品基本情報

薬効	2252 イソプレナリン系製剤	一般名	テルブタリン硫酸塩錠
英名	Bricanyl	剤型	錠
薬価	6.10	規格	2mg 1錠
メーカー	アストラゼネカ	毒劇区分	

ブリカニール錠2mgの効能・効果

(気管支拡張症、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎)の気道閉塞性障害にもとづく呼吸困難の諸症状の緩解

ブリカニール錠2mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. キサンチン誘導体併用、ステロイド剤併用、利尿剤併用	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
3. 甲状腺機能亢進症、高血圧、心疾患、糖尿病、低酸素血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ブリカニール錠2mgの副作用等

1. アナフィラキシー、呼吸困難、血管浮腫、蕁麻疹、重篤な血清カリウム値低下、血清カリウム値低下増強	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、頻脈、血圧変動、胸部圧迫感、不整脈、手指のこわばり、手指のしびれ感、めまい、ふらつき、痙直、不眠、傾眠、激越、運動過多、情緒不安	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 動悸、手指振戦、頭痛、悪心、嘔吐、食欲不振	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 心リズムに及ぼす作用が増強

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

5. 不整脈、心停止、頭痛、不安感、振戦、強直性筋痙直、心悸亢進、血圧低下、高血糖、乳酸アシドーシス、低カリウム血症、母体において重篤な循環器系副作用、死亡、卵巣間膜過形成、卵巣嚢胞、卵巣間膜平滑筋腫

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ブリカニール錠2mgの相互作用

1. 薬剤名等：カテコールアミン製剤

発現事象 心停止、不整脈

投与条件 -

理由・原因 アドレナリン作動性神経刺激の増大

指示 注意

2. 薬剤名等：キサンチン誘導体

発現事象 低カリウム血症による不整脈

投与条件 -

理由・原因 c-AMP量が増加し、血清カリウム値の低下を増強

指示 注意

3. 薬剤名等：ステロイド剤

発現事象 低カリウム血症による不整脈

投与条件 -

理由・原因 ステロイド剤及びカリウム排泄型利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下を増強

指示 注意

4. 薬剤名等：カリウム排泄型利尿剤

発現事象 低カリウム血症による不整脈

投与条件 -

理由・原因 ステロイド剤及びカリウム排泄型利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下を増強

指示 注意

5. 薬剤名等：β遮断剤

発現事象 本剤の作用を減弱

投与条件 -

理由・原因 β遮断剤は、β2刺激剤である本剤の作用と拮抗

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』