

商品名 サルブタモール錠2mg「日医工」 医薬品基本情報

薬効	2254 サルブタモール製剤	一般名	サルブタモール硫酸塩錠
英名	Salbutamol sulfate	剤型	錠
薬価	5.70	規格	2mg 1錠
メーカー	日医工	毒劇区分	

サルブタモール錠2mg「日医工」の効能・効果

(気管支喘息、急性気管支炎、珪肺結核、小児喘息、肺気腫、肺結核、慢性気管支炎)の気道閉塞性障害の諸症状の緩解

サルブタモール錠2mg「日医工」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. キサンチン誘導体併用、ステロイド剤併用、利尿剤併用	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
3. 甲状腺機能亢進症、高血圧、心疾患、糖尿病、低酸素血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サルブタモール錠2mg「日医工」の副作用等

1. 重篤な血清カリウム値低下、血清カリウム値低下増強、ショック、アナフィラキシー	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、血圧低下、蕁麻疹、落ち着きのなさ、潮紅、浮腫、筋痙攣	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 心悸亢進、脈拍増加、頭痛、振戦、睡眠障害、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、口渇、湿疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. そう痒感、血管性浮腫、不整脈、血圧変動、めまい、眠気、興奮、下肢疼痛、口内炎、発汗	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
5. 心リズムに及ぼす作用を増強	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 一過性の β 作用を介する症状、低カリウム血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 不整脈、心停止、催奇形作用、乳酸アシドーシス、代謝性アシドーシス、悪心、嘔吐、高血糖、心血管系症状、脈拍増加、心悸亢進	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

サルブタモール錠2mg「日医工」の相互作用

1. 薬剤名等：カテコールアミン		
発現事象	心停止、不整脈	投与条件 -
理由・原因	カテコールアミン併用により、アドレナリン作動性神経刺激の増大	指示 注意
2. 薬剤名等：キサンチン誘導体		
発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件 -
理由・原因	キサンチン誘導体はアドレナリン作動性神経刺激を増大させるため、血清カリウム値の低下を増強	指示 注意
3. 薬剤名等：ステロイド剤		
発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件 -
理由・原因	ステロイド剤及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が増強	指示 注意
4. 薬剤名等：利尿剤		
発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件 -
理由・原因	ステロイド剤及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が増強	指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.