

商品名 ツロブテロールテープ2mg「トーフ」 医薬品基本情報

薬効	2259 その他の気管支拡張剤	一般名	ツロブテロール貼付剤
英名	Tulobuterol TOWA	剤型	貼付剤
薬価	29.00	規格	2mg 1枚
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

ツロブテロールテープ2mg「トーフ」の効能・効果

(気管支喘息、急性気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎)の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難の諸症状の緩解

ツロブテロールテープ2mg「トーフ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. キサンチン誘導体併用、ステロイド剤併用、利尿剤併用	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
3. 甲状腺機能亢進症、高血圧症、心疾患、糖尿病、アトピー性皮膚炎、低酸素血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ツロブテロールテープ2mg「トーフ」の副作用等

1. アナフィラキシー、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹、重篤な血清カリウム値低下、血清カリウム値低下増強	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. CK上昇	記載場所	その他の副作用
3. 過敏症、蕁麻疹、顔面紅潮、不整脈、頻脈、熱感、こわばり感、胃部不快感、AST上昇、ALT上昇、好酸球数増加、適用部位疼痛、適用部位変色、口渇、筋肉痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 心悸亢進、振戦、頭痛、不眠、悪心、嘔吐、適用部位そう痒感、適用部位紅斑、接触性皮膚炎、血清カリウム値低下	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 発疹、そう痒症、全身倦怠感、めまい、興奮、しびれ感、筋痙縮、食欲不振、下痢、胸痛、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. 心リズムに及ぼす作用を増強	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 不整脈、心停止、心悸亢進、血中濃度上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ツロブテロールテープ2mg「トーフ」の相互作用

1. 薬剤名等：カテコールアミン製剤

発現事象	心停止、不整脈	投与条件	-
理由・原因	本剤及びカテコールアミン製剤はともに交感神経刺激作用を持つ	指示	注意

2. 薬剤名等：キサンチン誘導体

発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件	-
理由・原因	本剤及びキサンチン誘導体はともに細胞内へのカリウム移行作用を持つ	指示	注意

3. 薬剤名等：ステロイド剤

発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件	-
理由・原因	ステロイド剤及び利尿剤は尿中へのカリウム排泄を増加	指示	注意

4. 薬剤名等：利尿剤

発現事象	低カリウム血症による不整脈	投与条件	-
理由・原因	ステロイド剤及び利尿剤は尿中へのカリウム排泄を増加	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』