

商品名 パルミコート吸入液0.5mg 医薬品基本情報

薬効	2290 その他の呼吸器官用薬	一般名	ブデソニド吸入剤
英名	Pulmicort	剤型	吸入剤
薬価	142.50	規格	0.5mg 2mL 1管
メーカー	アストラゼネカ	毒劇区分	

パルミコート吸入液0.5mgの効能・効果

気管支喘息

パルミコート吸入液0.5mgの使用制限等

1. 深在性真菌症、有効な抗菌剤の存在しない感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で接触性皮膚炎の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 喘息の急激な悪化状態、喘息発作重積状態	記載場所	効能・効果
	注意レベル	原則禁止
3. 感染を伴う喘息症状の増悪、結核性疾患、感染症＜有効な抗菌剤の存在しない感染症・深在性真菌症を除く＞、気管支粘液の分泌が著しい、長期又は大量の全身性ステロイド療法、重度肝機能障害のある乳幼児	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

パルミコート吸入液0.5mgの副作用等

1. 味覚異常、気管支痙攣	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 発疹、蕁麻疹、接触性皮膚炎、血管浮腫、過敏症状、咽喉頭症状、咽喉頭刺激感、咽喉頭疼痛、口腔カンジダ症、咳嗽、嘔声、口腔感染、呼吸器感染、鼻出血、悪心、落ち着きのなさ、行動障害、神経過敏、うつ病、不眠、皮膚挫傷	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 肺炎、気管支肺炎	記載場所	使用上の注意
4. 副腎皮質機能低下、全身作用	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

5. 小児成長遅延

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

6. 好酸球増多症、鼻炎、鼻炎増悪、湿疹、湿疹増悪、蕁麻疹、蕁麻疹増悪、眩暈、眩暈増悪、動悸、動悸増悪、倦怠感、倦怠感増悪、顔のほてり、顔のほてり増悪、結膜炎、結膜炎増悪、催奇形作用、副腎皮質系機能低下、白内障、平均身長がプラセボ群に比べて低かった

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 肺炎

記載場所 使用上の注意

頻度 5%未満

パルミコート吸入液0.5mgの相互作用

1. 薬剤名等：CYP3A4阻害剤

発現事象 副腎皮質ステロイド剤を全身投与した場合と同様の症状

投与条件 -

理由・原因 CYP3A4による本剤の代謝が阻害されることにより、本剤の血中濃度が上昇

指示 注意

パルミコート吸入液0.5mgの配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 希望禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』