

商品名 エナジア吸入用カプセル高用量 医薬品基本情報

薬効	2290 その他の呼吸器官用薬	一般名	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフラン
英名	Enerzair	剤型	吸入剤
薬価	331.50	規格	1カプセル
メーカー	ノバルティス ファーマ	毒劇区分	

エナジア吸入用カプセル高用量の効能・効果

気管支喘息

エナジア吸入用カプセル高用量の使用制限等

1. 閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害、排尿障害、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、深在性真菌症、有効な抗菌剤の存在しない感染症、デスモプレシン酢酸塩水和物投与中＜男性における夜間多尿による夜間頻尿＞	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重度腎機能障害、透析を必要とする末期腎不全、eGFR30mL／min／1.73m ² 未満	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
3. 糖尿病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 結核性疾患、感染症＜有効な抗菌剤の存在しない感染症・深在性真菌症を除く＞、甲状腺機能亢進症、冠動脈疾患又はその既往、急性心筋梗塞又はその既往、高血圧又はその既往、心血管障害又はその既往、心不全又はその既往、不整脈又はその既往、QT間隔延長又はその既往、痙攣性疾患、てんかん、前立腺肥大＜排尿障害のある場合を除く＞、低酸素血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

エナジア吸入用カプセル高用量の副作用等

1. アナフィラキシー、血管浮腫、呼吸困難、舌腫脹、口唇腫脹、顔面腫脹、蕁麻疹、皮疹、重篤な血清カリウム値低下、心房細動	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 発声障害	記載場所	その他の副作用

3. カンジダ症、尿路感染、高血糖、頭痛、頻脈、口腔咽頭痛、咳嗽、胃腸炎、口内乾燥、発疹、皮膚そう痒症、排尿困難、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 筋痙縮、筋骨格痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 全身性作用	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 心リズムに及ぼす影響が増強	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 全身性作用、クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児成長遅延、骨密度低下、白内障、緑内障、気管支痙攣、不整脈、心停止、催奇形性作用、骨格変異、生殖発生毒性、 β 2刺激剤の薬理学的作用による症状、頻脈、振戦、動悸、頭痛、悪心、嘔吐、傾眠、心室性不整脈、代謝性アシドーシス、低カリウム血症、高血糖、抗コリン剤の薬理学的作用による症状、口内乾燥、排尿困難、眼圧上昇、便秘、ステロイド剤による副腎皮質系機能抑制、心血管症状	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

エナジア吸入用カプセル高用量の相互作用

1. 薬剤名等：デスモプレシン酢酸塩水和物	発現事象	低ナトリウム血症	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：CYP3A4を阻害する薬剤	発現事象	ステロイド剤を全身投与した場合と同様の症状	投与条件	-
	理由・原因	CYP3A4の活性を阻害することにより、モメタゾンフランカルボン酸エステル代謝が阻害され、血中濃度が上昇	指示	注意
3. 薬剤名等：CYP3A4を阻害する薬剤	発現事象	インダカテロールの血中濃度が上昇	投与条件	-
	理由・原因	CYP3A4の活性を阻害することにより、インダカテロールの代謝が阻害	指示	注意
4. 薬剤名等：P糖蛋白を阻害する薬剤	発現事象	インダカテロールの血中濃度が上昇	投与条件	-
	理由・原因	P糖蛋白の活性を阻害することにより、インダカテロールの排泄が阻害	指示	注意
5. 薬剤名等：リトナビル				

発現事象	インダカテロールのAUCが1.6～1.8倍に上昇、インダカテロールのAUCが上昇	投与条件	-
理由・原因	CYP3A4及びP糖蛋白の活性を阻害することにより、インダカテロールの代謝及び排泄が阻害	指示	注意

6. 薬剤名等：QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤

発現事象	QT間隔が延長され心室性不整脈等のリスクが増大	投与条件	-
理由・原因	いずれもQT間隔を延長	指示	注意

7. 薬剤名等：交感神経刺激剤

発現事象	インダカテロールの作用が増強	投与条件	-
理由・原因	アドレナリン作動性神経刺激が増大	指示	注意

8. 薬剤名等：キサンチン誘導体

発現事象	低カリウム血症による心血管事象＜不整脈＞	投与条件	-
理由・原因	キサンチン誘導体はアドレナリン作動性神経刺激を増大させるため、血清カリウム値の低下が増強	指示	注意

9. 薬剤名等：ステロイド剤

発現事象	低カリウム血症による心血管事象＜不整脈＞	投与条件	-
理由・原因	ステロイド剤及びこれらの利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が増強	指示	注意

10. 薬剤名等：利尿剤

発現事象	低カリウム血症による心血管事象＜不整脈＞	投与条件	-
理由・原因	ステロイド剤及びこれらの利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が増強	指示	注意

11. 薬剤名等： β 遮断剤

発現事象	インダカテロールの作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	インダカテロールの作用が拮抗	指示	注意

