

商品名 タンニン酸アルブミン「メタル」 医薬品基本情報

薬効	2312 タンニン酸系製剤	一般名	タンニン酸アルブミン
英名	Albumin tannate	剤型	末
薬価	7.20	規格	1g
メーカー	中北薬品	毒劇区分	

タンニン酸アルブミン「メタル」の効能・効果

下痢症

タンニン酸アルブミン「メタル」の使用制限等

1. 出血性大腸炎、重篤な細菌性下痢、牛乳アレルギーを起こし易い体質、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、経口鉄剤投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 細菌性下痢	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

タンニン酸アルブミン「メタル」の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、蕁麻疹、顔面浮腫、過敏症状、気管支喘息発作	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 肝障害、便秘、食欲不振	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. ショック、アナフィラキシー	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

タンニン酸アルブミン「メタル」の相互作用

1. 薬剤名等：経口鉄剤

発現事象 相互に作用が減弱

理由・原因 鉄と結合し、タンニン酸鉄となり、タンニン酸による収れん作用が減弱

投与条件 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：ロペラミド塩酸塩

発現事象 効果が減弱

理由・原因 本剤がロペラミド塩酸塩を吸着

投与条件 -

指示 注意

タンニン酸アルブミン「メタル」の配合変化

1. 薬剤名等：アルカリ

発現事象 分解

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

2. 薬剤名等：抱水クロラール

発現事象 湿潤

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

3. 薬剤名等：ヨウ化物

発現事象 湿潤

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』