

商品名 シメチジン錠200mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	2325 H 2 遮断剤	一般名	シメチジン200mg錠
英名	Cimetidine	剤型	錠
薬価	5.90	規格	200mg 1錠
メーカー	陽進堂	毒劇区分	

シメチジン錠200mg「YD」の効能・効果

Zollinger－Ellison症候群、胃潰瘍、逆流性食道炎、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、(急性ストレス潰瘍、出血性胃炎、消化性潰瘍)の上部消化管出血、(急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期)の(胃粘膜出血、胃粘膜発赤、胃粘膜浮腫、胃粘膜びらん、胃粘膜病変)の改善

シメチジン錠200mg「YD」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害、血液透析	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 腎機能障害	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
4. 薬物過敏症の既往、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

シメチジン錠200mg「YD」の副作用等

1. 肝障害、黄疸、AST上昇、ALT上昇	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 意識障害、痙攣	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、全身倦怠、脱力、皮下出血、粘膜下出血、発熱	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
4. ショック、アナフィラキシー、全身発赤、呼吸困難、間質性腎炎、急性腎障害、発熱、腎機能検査値異常、BUN上昇、クレアチニン上昇、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、房室ブロック、心ブロック	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
5. 過敏症、発疹、女性化乳房、便秘	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. BUN上昇、一過性クレアチニン上昇、末梢神経障害、過敏性血管炎、乳汁分泌、帯下増加、勃起障害、可逆性の錯乱状態、痙攣、頭痛、めまい、四肢のしびれ、四肢こわばり感、眠気、ヒポコンドリー様症状、無気力感、うつ状態、幻覚、頻脈、徐脈、動悸、腹部膨満感、下痢、発熱、全身熱感、排尿困難、筋肉痛、膵炎、脱毛	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
7. 意識喪失、重篤な中枢神経症状、死亡、前立腺重量減少、精のう重量減少、良性精巣間細胞腫	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

シメチジン錠200mg「YD」の相互作用

1. 薬剤名等：肝薬物代謝酵素P-450の活性低下により代謝・排泄が遅延する薬剤

発現事象	血中濃度を高める	投与条件	-
理由・原因	本剤が肝薬物代謝酵素P-450（CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6、CYP3A4等）を阻害して、これらの医薬品の代謝、排泄を遅延	指示	慎重投与

2. 薬剤名等：プロカインアミド

発現事象	血中濃度を高める	投与条件	-
理由・原因	本剤が近位尿細管におけるプロカインアミドの輸送を阻害し、腎クリアランスを減少	指示	慎重投与

3. 薬剤名等：エリスロマイシン

発現事象	血中濃度を高める	投与条件	-
理由・原因	-	指示	慎重投与



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

