

商品名 アルサルミン細粒90% 医薬品基本情報

薬効	2329 その他の消化性潰瘍用剤	一般名	スクラルファート水和物細粒
英名	Ulcerlmin	剤型	細粒
薬価	6.70	規格	90% 1g
メーカー	富士化学	毒劇区分	

アルサルミン細粒90%の効能・効果

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、(急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期)の(胃粘膜出血、胃粘膜発赤、胃粘膜浮腫、胃粘膜びらん、胃粘膜病変)の改善

アルサルミン細粒90%の使用制限等

1. 透析療法	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. リン酸塩の欠乏、腎障害、経管栄養処置中、新生児発育不全	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

アルサルミン細粒90%の副作用等

1. 発疹、蕁麻疹、過敏症、アナフィラキシー反応、アルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 便秘、口渇、悪心	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 嘔気	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
4. アルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

5. アルミニウム脳症、アルミニウム骨症、貧血、胃石、食道結石

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

アルサルミン細粒90%の相互作用

1. 薬剤名等：クエン酸製剤

発現事象	血中アルミニウム濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	キレートを形成し、アルミニウムの吸収が促進	指示	注意

2. 薬剤名等：血清カリウム抑制イオン交換樹脂

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	アルミニウムイオンと非選択的に交換	指示	注意

3. 薬剤名等：ニューキノロン系抗菌剤

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	アルミニウムイオンと併用薬剤が不溶性のキレートを形成	指示	注意

4. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	本剤が併用薬剤を吸着	指示	注意

5. 薬剤名等：フェニトイン

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	本剤が併用薬剤を吸着	指示	注意

6. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	本剤が併用薬剤を吸着	指示	注意

7. 薬剤名等：スルピリド等

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	本剤が併用薬剤を吸着	指示	注意

8. 薬剤名等：甲状腺ホルモン剤

発現事象	吸収を遅延又は阻害	投与条件	同時
理由・原因	消化管内で本剤と吸着	指示	注意

9. 薬剤名等：胆汁酸製剤

発現事象 吸収を遅延又は阻害

投与条件 同時

理由・原因 消化管内で本剤と吸着

指示 注意

10. 薬剤名等：テオフィリン徐放性製剤

発現事象 AUCが低下

投与条件 同時

理由・原因 本剤がテオフィリン徐放性製剤の吸収を阻害

指示 注意

11. 薬剤名等：キニジン等

発現事象 排泄が遅延

投与条件 -

理由・原因 制酸剤による尿のpH上昇

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』