

商品名 マナミンTM散 医薬品基本情報

薬効	2339 その他の健胃消化剤	一般名	ビオヂアスターゼ・生薬配合剤（1）散
英名	Manamin TM	剤型	散
薬価	6.30	規格	1g
メーカー	鶴原製薬	毒劇区分	

マナミンTM散の効能・効果

(胃部不快感、胃もたれ、嘔気、嘔吐、食欲不振、消化器症状)の改善

マナミンTM散の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、透析療法、高ナトリウム血症、ナトリウム摂取制限、浮腫、妊娠高血圧症候群、高カルシウム血症、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎不全、重篤な消化管潰瘍、心機能障害、肺機能障害、リン酸塩低下、低クロル性アルカローシス等の電解質失調	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与

マナミンTM散の副作用等

1. 腎結石、尿路結石、代謝異常、高マグネシウム血症、便秘、過敏症、発疹、低カリウム血症、血圧上昇、体重増加、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. アルミニウム脳症、アルミニウム骨症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

マナミンTM散の相互作用

1. 薬剤名等：活性型ビタミンD	発現事象	高カルシウム血症	投与条件	-
	理由・原因	これらの薬剤は腸管でのカルシウム吸収を促進	指示	注意
2. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質等				

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	消化管内で難溶性のキレートを形成し、これらの薬剤の吸収を阻害	指示	注意

3. 薬剤名等：ニューキノロン系抗菌剤

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	消化管内で難溶性のキレートを形成し、これらの薬剤の吸収を阻害	指示	注意

4. 薬剤名等：大量の牛乳

発現事象	アルカローシス、高カルシウム血症、高窒素血症、Milk－alkali syndrome	投与条件	-
理由・原因	牛乳と炭酸水素ナトリウムを大量摂取した場合に起こる症候群	指示	注意

5. 薬剤名等：カルシウム製剤

発現事象	アルカローシス、高カルシウム血症、高窒素血症、Milk－alkali syndrome	投与条件	-
理由・原因	牛乳と炭酸水素ナトリウムを大量摂取した場合に起こる症候群	指示	注意

6. 薬剤名等：併用薬剤

発現事象	吸収・排泄に影響	投与条件	-
理由・原因	本剤の吸着作用又は消化管内・体液のpH上昇	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』