

商品名 炭酸水素ナトリウム「東海」 医薬品基本情報

薬効	2344 無機塩製剤	一般名	炭酸水素ナトリウム
英名	Sodium bicarbonate	剤型	末
薬価	7.70	規格	10g
メーカー	東海製薬	毒劇区分	

炭酸水素ナトリウム「東海」の効能・効果

(胃潰瘍、胃下垂症、胃酸過多症、急性胃炎、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、薬剤性胃炎、胃炎、上部消化管機能異常、神経性食思不振)の(制酸作用、症状の改善)、アシドーシスの改善、尿酸排泄の促進、痛風発作の予防、上気道炎の(粘液溶解、補助療法)

炭酸水素ナトリウム「東海」の使用制限等

1. 高ナトリウム血症、ナトリウム摂取制限、浮腫、妊娠高血圧症候群、ヘキサミン投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重篤な消化管潰瘍、心機能障害、肺機能障害、低クロル性アルカローシス等の電解質失調、腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

炭酸水素ナトリウム「東海」の副作用等

1. 代謝異常、アルカローシス、ナトリウム蓄積、浮腫、胃部膨満、胃酸二次的分泌、胃酸リバウンド現象	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

炭酸水素ナトリウム「東海」の相互作用

1. 薬剤名等：ヘキサミン			
発現事象	効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	ヘキサミンは酸性尿中でホルムアルデヒドとなり抗菌作用を発現するが、本剤は尿のpHを上昇させヘキサミンの効果を減弱	指示	禁止
2. 薬剤名等：大量の牛乳			

発現事象	アルカローシス、高カルシウム血症、高窒素血症、milk－al kali syndrome	投与条件	-
理由・原因	代謝性アルカローシスが持続することにより、尿細管でのカルシウム再吸収が増加	指示	注意

3. 薬剤名等：カルシウム製剤

発現事象	アルカローシス、高カルシウム血症、高窒素血症、milk－al kali syndrome	投与条件	-
理由・原因	代謝性アルカローシスが持続することにより、尿細管でのカルシウム再吸収が増加	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』