

商品名 硫酸マグネシウム「東海」 医薬品基本情報

薬効	2355 無機塩製剤	一般名	硫酸マグネシウム水和物
英名	Magnesium sulfate hydrate	剤型	末
薬価	7.70	規格	10g
メーカー	東海製薬	毒劇区分	

硫酸マグネシウム「東海」の効能・効果

便秘症、胆石症、低マグネシウム血症、子癇、頻脈性不整脈

硫酸マグネシウム「東海」の使用制限等

- 高マグネシウム血症、心疾患、腎障害、腸内寄生虫疾患のある小児

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

硫酸マグネシウム「東海」の副作用等

- マグネシウム中毒、熱感、血圧降下、中枢神経抑制、呼吸麻痺

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- 高カリウム血症

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

- 中枢神経系抑制、骨格筋弛緩、呼吸麻痺、高マグネシウム血症、胎動低下、心不全、高カリウム血症、低カルシウム血症、くる病様骨病変、異常吸収

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

硫酸マグネシウム「東海」の相互作用

- 薬剤名等：ニューキノロン系抗菌剤

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	マグネシウムがこれらの薬剤と難溶性のキレートを形成し、これらの薬剤の吸収を阻害	指示	注意

2. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	マグネシウムがこれらの薬剤と難溶性のキレートを形成し、これらの薬剤の吸収を阻害	指示	注意

3. 薬剤名等：エチドロン酸二ナトリウム

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	マグネシウムがこれらの薬剤と難溶性のキレートを形成し、これらの薬剤の吸収を阻害	指示	注意

4. 薬剤名等：ペニシラミン

発現事象	効果が減弱	投与条件	同時
理由・原因	吸収率が低下	指示	注意

5. 薬剤名等：セフジニル

発現事象	効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

6. 薬剤名等：リトドリン塩酸塩

発現事象	CK上昇	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

7. 薬剤名等：リトドリン塩酸塩

発現事象	出生した早産児の高カリウム血症のリスクが高い	投与条件	子癇
理由・原因	-	指示	注意

硫酸マグネシウム「東海」の配合変化

1. 薬剤名等：サルファ剤を含む製剤

発現事象	沈殿	投与条件	注射、注入
理由・原因	-	指示	禁止

2. 薬剤名等：アルカリ炭酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿	投与条件	注射、注入
理由・原因	-	指示	禁止

3. 薬剤名等：アルカリ炭酸水素塩を含む製剤

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----

4. 薬剤名等：酒石酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----

5. 薬剤名等：可溶性リン酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----

6. 薬剤名等：ヒ酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----

7. 薬剤名等：臭化カリウムを含む製剤

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----

8. 薬剤名等：臭化アンモニウムを含む製剤等

発現事象	沈殿
------	----

理由・原因	-
-------	---

投与条件	注射、注入
------	-------

指示	禁止
----	----



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』