

商品名 チノカプセル125 医薬品基本情報

薬効	2362 胆汁酸製剤	一般名	ケノデオキシコール酸カプセル
英名	Chino	剤型	カプセル
薬価	21.80	規格	125mg 1カプセル
メーカー	藤本製薬	毒劇区分	

チノカプセル125の効能・効果

コレステロール系胆石の溶解

チノカプセル125の使用制限等

1. 重篤な胆道障害、重篤な膵障害、重篤な肝障害、肝・胆道系に閉塞性病変	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 消化管に潰瘍性病変、胆管に胆石、肝障害の既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

チノカプセル125の副作用等

1. ALT上昇、AST上昇、下痢	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. Al-P上昇、ビリルビン上昇、腹部不快感、腹部膨満感、過敏症、発疹、そう痒、倦怠感、めまい、顔のむくみ	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 軟便、悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、胸やけ	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 肝障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
5. 胆汁うっ滞、胎仔肝の組織学的変化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

チノカプセル125の相互作用

1. 薬剤名等：スルフォニル尿素系経口糖尿病薬

発現事象	血糖降下作用を増強
------	-----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	本剤によりトルブタミドが血漿蛋白から遊離
-------	----------------------

指示	注意
----	----

2. 薬剤名等：制酸剤

発現事象	本剤の作用を減弱
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	アルミニウムを含有する制酸剤は本剤を吸着し、本剤の吸収が阻害
-------	--------------------------------

指示	注意
----	----

3. 薬剤名等：コレスチラミン

発現事象	本剤の作用を減弱
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	コレスチラミンは陰イオン交換樹脂であるため、本剤と結合し吸収が阻害
-------	-----------------------------------

指示	注意
----	----

4. 薬剤名等：脂質低下剤

発現事象	本剤の作用を減弱
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	脂質低下剤は胆汁中のコレステロール分泌を促進するため、コレステロール胆石形成が促進
-------	---

指示	注意
----	----



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』