

## 商品名 プリモボラン錠5mg 医薬品基本情報

|      |                                      |      |              |
|------|--------------------------------------|------|--------------|
| 薬効   | <a href="#">2449 その他のたん白同化ステロイド剤</a> | 一般名  | メテノロン酢酸エステル錠 |
| 英名   | Primobolan                           | 剤型   | 錠            |
| 薬価   | 12.10                                | 規格   | 5mg 1錠       |
| メーカー | <a href="#">バイエル薬品</a>               | 毒劇区分 |              |

## プリモボラン錠5mgの効能・効果

骨粗鬆症、(悪性腫瘍、外傷、熱傷、慢性腎疾患)の消耗状態、再生不良性貧血の骨髄の消耗状態

## プリモボラン錠5mgの使用制限等

|                                         |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| 1. 前立腺癌又はその恐れ・疑い、アンドロゲン依存性悪性腫瘍又はその恐れ・疑い | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                         | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 前立腺肥大、心疾患、癌の骨転移、糖尿病、腎疾患、肝疾患          | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                         | 注意レベル | 注意     |

## プリモボラン錠5mgの副作用等

|                                                                                       |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. 著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸                                              | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                                                       | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. 過敏症状、AST上昇、ALT上昇、悪心、嘔吐、嘔声、月経異常、多毛、ざ瘡、色素沈着、陰核肥大、性欲亢進、陰茎肥大、陰萎、持続性勃起、精子減少、精液減少、睾丸機能抑制 | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                       | 頻度   | 頻度不明    |
| 3. 肝機能障害、黄疸                                                                           | 記載場所 | 使用上の注意  |
|                                                                                       | 頻度   | 頻度不明    |
| 4. ナトリウム貯留、体液貯留、高カルシウム血症、男性化、骨端早期閉鎖、性的早熟、肝腫瘍                                          | 記載場所 | 使用上の注意  |
|                                                                                       | 頻度   | 頻度不明    |

## プリモラン錠5mgの相互作用

1. 薬剤名等：副腎皮質ホルモン剤

発現事象 耐糖能の低下

投与条件 -

理由・原因 -

指示 慎重投与

2. 薬剤名等：クマリン系抗凝血剤

発現事象 作用を増強

投与条件 -

理由・原因 -

指示 慎重投与



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.