

商品名 ペラニンデポー筋注5mg 医薬品基本情報

薬効	2473 エストラジオール系製剤	一般名	エストラジオール吉草酸エステル注射液
英名	Pelanin depot	剤型	注射液
薬価	150.00	規格	5mg 1管
メーカー	持田製薬	毒劇区分	

ペラニンデポー筋注5mgの効能・効果

稀発月経、過少月経、過多月経、月経困難症、多発月経、無月経、月経周期異常、月経量異常、機能性子宮出血、子宮發育不全症、卵巣欠落症状、更年期障害、不妊症

ペラニンデポー筋注5mgの使用制限等

- 子宮内膜癌又はその恐れ・疑い、乳癌又はその恐れ・疑い、エストロゲン依存性悪性腫瘍又はその恐れ・疑い、乳癌の既往、未治療の子宮内膜増殖症、血栓性静脈炎又はその既往、肺塞栓症又はその既往、脳卒中又はその既往、冠動脈性心疾患又はその既往、動脈性血栓塞栓疾患又はその既往、重篤な肝障害、診断の確定していない異常性器出血
- 子宮筋腫、子宮内膜症、心疾患又はその既往、てんかん、精神障害の既往、糖尿病、骨成長が終了していない又はその恐れ・疑い、乳房レントゲン像に異常、乳房結節、乳腺症、乳癌家族素因が強い、術前、長期臥床、全身性エリテマトーデス、腎疾患又はその既往、肝障害<重篤な肝障害を除く>、子宮摘出の既往

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

ペラニンデポー筋注5mgの副作用等

- 血栓症
- 過敏症、発疹、精神障害再発、高カルシウム血症、ナトリウム貯留、体液貯留、消退出血、不正出血、経血量変化、乳房痛、乳房緊満感、疼痛、発赤、硬結、頭痛
- 乳癌、ナトリウム貯留、体液貯留、高カルシウム血症、骨端早期閉鎖、性的早熟、血液凝固能が亢進、仔の成長後腔上皮の癌性変性、仔の成長後子宮内膜の癌性変性、子宮内膜癌、冠動脈性心疾患、脳卒中、脳梗塞、アルツハイマー、認知症、卵巣癌、胆嚢疾患

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ペラニンデポー筋注5mgの相互作用

1. 薬剤名等：血糖降下剤

発現事象	血糖降下作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	卵胞ホルモン（主に結合型エストロゲン、合成エストロゲン）は耐糖能を変化させ血糖を上昇	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版『DIR』