

商品名 ジノプロスト注射液2000 μ g「F」 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	ジノプロスト2mg2mL注射液
英名	Dinoprost	剤型	注射液
薬価	500.00	規格	2mg 2mL 1管
メーカー	富士製薬	毒劇区分	(劇)

ジノプロスト注射液2000 μ g「F」の効能・効果

妊娠末期の(陣痛促進、陣痛誘発、分娩促進)、(術後腸管麻痺、麻痺性イレウス)の腸管蠕動亢進、治療的流産

ジノプロスト注射液2000 μ g「F」の使用制限等

- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、気管支喘息又はその既往、骨盤狭窄、児頭骨盤不均衡、胎位異常、横位、骨盤位、前置胎盤、常位胎盤早期剥離<胎児生存時>、重度胎児機能不全、過強陣痛、子宮切開の既往、帝王切開の既往、オキシトシン投与中、ジノプロスト投与中、PGE2投与中、プラステロン硫酸投与中、プラステロン硫酸投与後十分な時間が経過していない、メトロイリント挿入後1時間以上経過していない、吸湿性頸管拡張材挿入中、ジノプロスト投与終了後1時間以上経過していない、PGE2投与終了後1時間以上経過していない、〈腸管蠕動亢進〉妊娠又は妊娠している可能性、出血又はその恐れ・疑い、子宮外妊娠、骨盤内感染による発熱、〈腸管蠕動亢進〉妊婦又は妊娠している可能性
- 多産婦、眼圧亢進、緑内障、心疾患、高血圧症、多胎妊娠、胎児機能不全<重度胎児機能不全を除く>、常位胎盤早期剥離<胎児死亡時>、児頭骨盤不均衡又はその恐れ・疑い、急性骨盤腔内感染症又はその既往、膣炎、頸管炎、子宮切開の既往、帝王切開の既往

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

ジノプロスト注射液2000 μ g「F」の副作用等

- 心室細動、心停止、ショック、喘鳴、呼吸困難
- 過強陣痛、子宮破裂、頸管裂傷、胎児機能不全、児切迫仮死徴候、徐脈、頻脈、羊水混濁
- 嘔気、腹痛、腹部膨満感、顔面潮紅、嘔吐

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 5%未満

記載場所 その他の副作用

4. 頻脈、血圧上昇、血圧下降、動悸、血管痛、静脈炎、発赤、頭痛、頭重、発汗、悪寒、発熱、手指のしびれ、過敏症、発疹、しびれ感、胸内苦悶、四肢冷感、全身倦怠感、耳鳴	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 顔面潮紅、嘔気、嘔吐、下痢、心悸亢進、血圧上昇、血圧下降、胸内苦悶、不整脈、腹部不快感、鼓腸、血管痛、口渇、頭痛、発汗、冷汗、動悸、発疹、頭重、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 心室細動、心停止、ショック、気管支収縮	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓、母体が重篤な転帰、児が重篤な転帰、胎児死亡、過強陣痛、子宮収縮、催奇形作用、副作用、心停止、心室性頻拍、心室性期外収縮、肺水腫、心筋障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ジノプロスト注射液2000 μ g「F」の相互作用

1. 薬剤名等：PGE2

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件
陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で同時

指示
禁止

2. 薬剤名等：オキシトシン

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件
陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で同時

指示
禁止

3. 薬剤名等：PGE2

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件
陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で同時

指示
禁止

4. 薬剤名等：プラステロン硫酸投与中

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件
陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示
禁止

5. 薬剤名等 : プラステロン硫酸投与後十分な時間が経過していない

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件

陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示

禁止

6. 薬剤名等 : 吸湿性頸管拡張材挿入中

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件

陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示

禁止

7. 薬剤名等 : メトロイリンテル挿入後1時間以上経過していない

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件

陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示

禁止

8. 薬剤名等 : ジノプロストン投与終了後1時間以上経過していない

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件

陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示

禁止

9. 薬剤名等 : PGE2投与終了後1時間以上経過していない

発現事象 過強陣痛

理由・原因 -

投与条件

陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進

指示

禁止

10. 薬剤名等 : オキシトシン

発現事象 過強陣痛

理由・原因 本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が併用により増強

投与条件

陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で同時

指示

禁止

11. 薬剤名等 : PGE2

発現事象 過強陣痛

理由・原因 本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が併用により増強

投与条件

陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で同時

指示

禁止

12. 薬剤名等 : PGE2

発現事象	-
理由・原因	-

投与条件	陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進の場合、本剤投与前に子宮頸管熟化
指示	慎重投与

13. 薬剤名等：オキシトシン

発現事象	過強陣痛
理由・原因	-

投与条件	陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で前後して投与
指示	慎重投与

14. 薬剤名等：PGE2

発現事象	過強陣痛
理由・原因	-

投与条件	陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で前後して投与
指示	慎重投与

15. 薬剤名等：PGE2

発現事象	-
理由・原因	-

投与条件	陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で前後して投与
指示	慎重投与

16. 薬剤名等：ジノプロストン

発現事象	過強陣痛
理由・原因	本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が前後して使用することにより増強

投与条件	陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進
指示	慎重投与

17. 薬剤名等：陣痛誘発・促進剤

発現事象	過強陣痛
理由・原因	本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が前後して使用することにより増強

投与条件	陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で前後して使用
指示	慎重投与

18. 薬剤名等：PGE2

発現事象

-

投与条件

陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進で前後して投与

理由・原因

本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が前後して使用することにより増強

指示

慎重投与

19. 薬剤名等：陣痛誘発・促進剤

発現事象

異常収縮

投与条件

治療的流産で前後して使用

理由・原因

本剤及びこれらの薬剤の有する子宮収縮作用が前後して使用することにより増強

指示

慎重投与



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』