

商品名 サンドスタチンLAR筋注用キット30mg 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	オクトレオチド酢酸塩キット
英名	Sandostatin LAR	剤型	キット類
薬価	154576.00	規格	30mg 1キット（溶解液付）
メーカー	ノバルティス ファーマ	毒劇区分	(劇)

サンドスタチンLAR筋注用キット30mgの効能・効果

(VIP産生腫瘍、ガストリン産生腫瘍、カルチノイド症候群の特徴を示すカルチノイド腫瘍、消化管ホルモン産生腫瘍)の諸症状の改善、消化管神経内分泌腫瘍、(下垂体性巨人症、先端巨大症)の(成長ホルモン分泌過剰状態、ソマトメジーンC分泌過剰状態)の諸症状の改善

サンドスタチンLAR筋注用キット30mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止

サンドスタチンLAR筋注用キット30mgの副作用等

1. 血圧低下、呼吸困難、気管支痙攣、アナフィラキシー、皮疹、そう痒、蕁麻疹、発疹、末梢性浮腫、徐脈	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 重篤な徐脈	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 胆石症、疼痛	記載場所	その他の副作用
4. 過敏症、発赤、甲状腺機能低下症、耐糖能異常、脱水、呼吸困難、膵炎、胃部不快感、腹痛、嘔吐、ビリルビン上昇、AST上昇、胆嚢炎、けん怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 発疹、そう痒、甲状腺機能障害、甲状腺刺激ホルモン減少、TSH減少、総サイロキシン減少、T4減少、遊離T4減少、高血糖、低血糖、ALP上昇、頭痛、めまい、下痢、便秘、腹部膨満、白色便、食欲不振、嘔気、鼓腸放屁、肝機能異常、胆管拡張、ALT上昇、γ-GTP上昇、脱毛、腎嚢胞、疲労感、硬結、腫脹、発赤	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

6. 胆石、胆石症悪化、急性胆嚢炎、胆管炎、膵炎

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 一過性低血糖、一過性高血糖、視野狭窄、疼痛、硬結、抗オクトレオチド抗体が出現、脂肪吸収が低下、血清ビタミンB12低下

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

サンドスタチンLAR筋注用キット30mgの相互作用

1. 薬剤名等：シクロスポリン

発現事象 血中濃度が低下

投与条件 -

理由・原因 本剤がシクロスポリンの吸収を阻害

指示 注意

2. 薬剤名等：インスリン製剤

発現事象 血糖降下作用の減弱による高血糖症状、血糖降下作用の増強による低血糖症状

投与条件 -

理由・原因 インスリン、グルカゴン及び成長ホルモン等互いに拮抗的に調節作用をもつホルモン間のバランスが変化

指示 注意

3. 薬剤名等：プロモクリプチン

発現事象 AUCが上昇

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』